

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

PARACODINA SCIROPPO

Diidrocodeina + acido benzoico

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è PARACODINA SCIROPPO e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere PARACODINA SCIROPPO
3. Come prendere PARACODINA SCIROPPO
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare PARACODINA SCIROPPO
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è PARACODINA SCIROPPO e a cosa serve

Questo medicinale contiene diidrocodeina.

È utilizzata per trattare la tosse secca.

2. Cosa deve sapere prima di prendere PARACODINA SCIROPPO

Non prenda PARACODINA SCIROPPO:

- se è allergico alla diidrocodeina, all'acido benzoico o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6),
- se soffre di insufficienza epatica grave (disfunzione grave del fegato),
- se soffre di insufficienza respiratoria,
- se soffre di stipsi (stitichezza) cronica,
- se prende un antidepressivo appartenente al gruppo degli inibitori delle monoaminossidasi (o se ne ha preso uno nelle ultime due settimane), o un altro medicinale appartenente al gruppo degli analgesici narcotici,
- se sta allattando con latte materno.

Non usare PARACODINA SCIROPPO nei bambini di età inferiore ai 6 anni.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere PARACODINA SCIROPPO.

PARACODINA SCIROPPO può causare sintomi di dipendenza dopo uso prolungato. In caso di dipendenza, quando il trattamento viene sospeso si possono verificare sintomi di astinenza, come irritabilità, agitazione, insonnia, ansia e palpitazioni (percezione del battito del cuore).

- Si rivolga al medico se è anziano e sta prendendo PARACODINA SCIROPPO ad alte dosi e/o per un lungo periodo di tempo, in quanto il medicinale può causare un peggioramento dei sintomi di altre malattie (per es. disturbi del cervello, difficoltà nell'urinare).

Pazienti che seguono un regime ipocalorico: tenga presente che un cucchiaino di PARACODINA SCIROPPO equivale ad un grammo di glucosio.

Altri medicinali e PARACODINA SCIROPPO

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Gli effetti di PARACODINA SCIROPPO sul sistema nervoso centrale sono potenziati dall'assunzione di altri medicinali come:

- sedativi
- tranquillanti

- antistaminici.

L'uso concomitante di PARACODINA SCIROPPO e farmaci sedativi come le benzodiazepine o derivati aumenta il rischio di sonnolenza, difficoltà a respirare (depressione respiratoria), coma e può essere pericoloso per la vita. Per questo motivo, l'uso concomitante deve essere preso in considerazione solo quando non sono possibili altre opzioni di trattamento.

Tuttavia, se il suo medico prescrive PARACODINA SCIROPPO insieme ad un altro farmaco sedativo, la dose e la durata del trattamento concomitante devono essere limitate dal suo medico.

Informi il medico di tutti i farmaci sedativi che sta usando e segua scrupolosamente le indicazioni sulla dose fornite dal suo medico. Può essere utile informare parenti e amici di fare attenzione ai segni e ai sintomi sopra indicati. Contatti il suo medico nel caso si presentino questi sintomi.

Il medico la terrà sotto stretto controllo se sta assumendo PARACODINA SCIROPPO assieme ad uno dei farmaci elencati per evitare gli effetti inattesi e indesiderati dovuti all'interazione.

PARACODINA SCIROPPO e alcol

- Durante il trattamento, non assuma alcol.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Questo medicinale passa nella placenta per cui è possibile che il bambino alla nascita manifesti problemi respiratori. Il medico le prescriverà PARACODINA SCIROPPO solo in caso di effettiva necessità.

Non utilizzi PARACODINA SCIROPPO durante l'allattamento con latte materno (vedere "Non prenda PARACODINA SCIROPPO").

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Poiché non è raro che si manifesti sonnolenza durante il trattamento, presti attenzione prima di mettersi alla guida di veicoli o di svolgere operazioni che richiedano integrità del grado di vigilanza.

PARACODINA SCIROPPO contiene saccarosio:

Questo medicinale contiene 2,5 g di saccarosio per dose (1 cucchiaino). Da tenere in considerazione nei pazienti affetti da diabete mellito.

Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri lo contatti prima di prendere questo medicinale.

3. Come prendere PARACODINA SCIROPPO

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Posologia

La dose raccomandata è:

Adulti e adolescenti (maggiori di 12 anni di età):

5-10 ml, 3-4 volte al giorno (ogni 6-8 ore), se necessario.

Non superare la dose massima giornaliera corrispondente a 48 mg di diidrocodeina e 72 mg di acido benzoico.

Bambini e adolescenti (dai 6 ai 12 anni):

2,5-5 ml, 3-4 volte al giorno (ogni 6-8 ore), se necessario.

Non superare la dose massima giornaliera corrispondente a 24 mg di diidrocodeina e 36 mg di acido benzoico.

PARACODINA SCIROPPO è controindicato nei bambini di età inferiore ai 6 anni.

Per un corretto dosaggio usare il cucchiaino dosatore, annesso alla confezione.

Un cucchiaino pieno (5 ml) equivale a 12 mg di diidrocodeina bitartrato e 12 mg di acido benzoico.

Anziani:

la dose sarà attentamente stabilita dal medico che valuterà un'eventuale diminuzione di dosaggio.

Modo di somministrazione

PARACODINA SCIROPPO deve essere assunta dopo i pasti, da sola o diluita in acqua o altri liquidi.

Durata di trattamento

Non superare i 7 giorni di trattamento.

Se prende più PARACODINA SCIROPPO di quanto deve

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di PARACODINA SCIROPPO, informi immediatamente il medico o si rivolga all'ospedale più vicino.

I sintomi di intossicazione da oppiacei segnalati sono: coma profondo (stato di assenza coscienza), diminuzione della frequenza respiratoria, abbassamento improvviso della pressione arteriosa, diminuzione dell'attività del cuore con mancanza di afflusso di sangue agli organi (depressione cardiocircolatoria), miosi (restringimento della pupilla), diminuzione della diuresi (produzione di urine), riduzione improvvisa della temperatura corporea, edema polmonare (accumulo di liquido nei polmoni).

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Sono stati riportati i seguenti effetti indesiderati con frequenza non nota (la frequenza non può essere stabilita sulla base dei dati disponibili):

- sedazione
- sonnolenza
- nausea
- vomito
- stipsi
- cefalea (mal di testa)
- vertigini
- astenia (debolezza)
- agitazione, soprattutto nelle persone anziane

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite l'Agenzia Italiana del Farmaco all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare PARACODINA SCIROPPO

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data di scadenza indicata si riferisce all'ultimo giorno di quel mese e al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.


APERTURA DEL FLACONE:

Per aprirlo:

- Appoggiare il flacone su una superficie piana
- Premere sul tappo del flacone e svitarlo

Per chiuderlo:

- Chiudere a fondo il tappo



Conservare a temperatura inferiore a 25 °C.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene PARACODINA SCIROPPO

I principi attivi sono: 12 mg di diidrocodeina bitartrato e 12 mg di acido benzoico per 5 ml di sciroppo

Gli altri componenti sono: acqua purificata, estratto di altea, estratto di grindelia, glicerina, saccarosio.

Descrizione dell'aspetto di PARACODINA SCIROPPO e contenuto della confezione

Sciroppo – Flacone da 83,3 ml

Scatola contenente un flacone in vetro con chiusura a "prova di bambino"

Nella confezione è incluso un cucchiaino dosatore con indicate tacche di livello corrispondenti alle capacità di 5 ml, 2,5 ml e 1,25 ml.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Teofarma S.r.l. - Via F.lli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (PV)

Produttore

Teofarma S.r.l. - Viale Certosa, 8/A - 27100 Pavia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 29 aprile 2021