

Mionevrasi®

polvere e solvente per soluzione iniettabile

Vitamine B₁+ B₆+ B₁₂

Composizione

1 fiala di liofilizzato contiene cianocobalamina (Vit.B₁₂) mg 1, piridossina cloridrato (Vit.B₆) mg 100, cocarbossilasi (Vit.B₁) mg 38,20.

Eccipienti: acido aminoacetico.

1 fiala di solvente contiene lidocaina cloridrato mg 10, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 3.

Forma farmaceutica e confezioni

Polvere e solvente per soluzione iniettabile. Uso intramuscolare.

Confezione contenente 5 fiale di liofilizzato + 5 fiale di solvente.

Categoria farmacoterapeutica

Polivitaminico.

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del produttore

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l. – Via F.lli Cervi, 8 – 27010 Valle Salimbene (PV).

Prodotto e controllato da Teofarma s.r.l. - Viale Certosa, 8/A - 27100 Pavia

Indicazioni

Stati di carenza di Vit. B₁, B₆, B₁₂ e patologie ad essi correlate, quali: polinevriti carenziali, nevriti in corso di trattamento con isoniazide, neuropatie alcoliche.

Terapia di supporto nelle nevriti non legate a carenza vitaminica e nelle nevralgie del trigemino e dello sciatico.

Controindicazioni

Ipersensibilità a uno o più componenti della specialità.

Opportune precauzioni d'uso

I preparati per via iniettabile contenenti vitamina B₁ o derivati, devono essere somministrati con cautela in soggetti che hanno una storia di precedenti reazioni da farmaci o di altre malattie allergiche (asma bronchiale, orticaria, angioedema, ecc.).

Non esistono particolari controindicazioni per l'uso del prodotto in gravidanza o durante l'allattamento.

Interazioni con altri farmaci

Particolare cautela deve essere usata qualora il prodotto sia prescritto insieme con levodopa per la terapia del morbo di Parkinson.

Posologia e modo di somministrazione

1 fiala al giorno per via intramuscolare. In casi particolari tale posologia può essere aumentata secondo giudizio del medico.

La durata del trattamento deve essere stabilita dal medico.

Sovradosaggio

Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio.

Effetti indesiderati

Raramente sono stati segnalati casi di reazione da sensibilizzazione alla vitamina B₁₂, quali eruzioni cutanee e sottocutanee, diarrea ed eccezionalmente manifestazioni anafilattiche.

Si consiglia di consultare il medico o il farmacista in caso di comparsa di effetti indesiderati non previsti dal presente foglio illustrativo.

Modalità di conservazione

Conservare a temperatura inferiore ai 25° C.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Data dell'ultima revisione del foglio illustrativo

Marzo 2021

I MEDICINALI NON VANNO TENUTI A PORTATA DI MANO DEI BAMBINI
