

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

REPARILEXIN 40 mg compresse rivestite
Escina

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Reparilexin e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Reparilexin
3. Come prendere Reparilexin
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Reparilexin
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Reparilexin e a cosa serve

Questo medicinale contiene il principio attivo escina ed è utilizzato per ridurre i sintomi di una condizione caratterizzata da un ritorno difficoltoso di sangue venoso al cuore (insufficienza venosa) e da una fragilità dei piccoli vasi sanguigni (capillari).

2. Cosa deve sapere prima di prendere Reparilexin

Non prenda Reparilexin

- se è allergico all'escina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se soffre di malattie che causano distruzione dei globuli rossi (malattie emolitiche);
- se presenta gonfiore non locale (edema generalizzato) dovuto ad accumulo di liquidi causato da problemi al cuore, ai reni e al sangue o midollo osseo;
- se soffre di una riduzione acuta o cronica della funzione renale (insufficienza renale, shock renale) o se ha avuto problemi ai reni;
- se è a rischio di formazione di coaguli di sangue nei vasi sanguigni (rischio trombotico);
- se sta assumendo dei medicinali che prevengono la gravidanza (contraccettivi orali).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Reparilexin.

Se assume Reparilexin e soffre di problemi che possono complicarsi a seguito di riduzione della funzione dei reni (per es. in caso di traumi da schiacciamento massivo, estese ustioni), il medico controllerà attentamente fin dall'inizio della terapia la funzione dei reni e, qualora si manifestassero delle alterazioni, le dirà di sospendere il trattamento con Reparilexin immediatamente.

Non sono noti casi di assuefazione e dipendenza.

Non prenda Reparilexin se soffre di una riduzione della funzione renale (vedere "Non prenda Reparilexin").

Altri medicinali e Reparilexin

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Eviti di assumere Reparilexin insieme ad antibiotici della famiglia degli aminoglicosidici (come la gentamicina) poiché l'assunzione contemporanea può aumentare la tossicità renale di tali antibiotici.

Prenda questo medicinale con cautela e si rivolga al medico se sta assumendo:

- medicinali utilizzati per migliorare la circolazione del sangue e per prevenire la formazione di coaguli (medicinali anticoagulanti). L'escina può potenziare l'azione degli anticoagulanti somministrati contemporaneamente. In questo caso il medico le aggiusterà la dose in base ai risultati delle analisi (ad esempio tempo di protrombina);
- medicinali utilizzati per il trattamento delle infezioni batteriche (antibiotici) come cefalotina oppure ampicillina. Questi medicinali interferiscono sul legame dell'escina con le proteine del sangue (proteine plasmatiche), provocando l'aumento di escina libera (non legata alle proteine) nel sangue.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Non prenda questo medicinale se è nei primi tre mesi di gravidanza o se sta allattando con latte materno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Questo medicinale non altera la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari.

Reparilexin contiene lattosio, saccarosio, olio di ricino e sodio

Questo medicinale contiene lattosio e saccarosio. Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Questo medicinale contiene olio di ricino che può causare disturbi gastrici e diarrea.

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa rivestita, cioè essenzialmente "senza sodio".

3. Come prendere Reparilexin

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

- Terapia di attacco:
La dose raccomandata è di 1 compressa rivestita da 40 mg, tre volte al giorno.
- Terapia di mantenimento o sintomatologia più lieve:
La dose raccomandata è di 1 compressa rivestita da 40 mg, 1 volta al giorno.

Uso negli adolescenti

La dose raccomandata è di 1 compressa rivestita da 40 mg, 1 volta al giorno.

Prenda questo medicinale con un poco di acqua e dopo i pasti, salvo diversa prescrizione medica.

Se prende più Reparilexin di quanto deve

Non sono noti casi di sovradosaggio, né sono noti antidoti specifici.

Se dimentica di prendere Reparilexin

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.
Prenda la normale dose successiva all'orario stabilito.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Rari casi di disturbi della digestione.

In alcuni casi possono comparire reazioni allergiche acute, ad es. irritazione della pelle (orticaria).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Reparilexin

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni**Cosa contiene Reparilexin**

- Il principio attivo è escina. Ogni compressa contiene 40 mg di escina.

Gli altri componenti sono esperidina, lattosio, polietilenglicole (Carbowax 1500), polietilenglicole (Carbowax 6000), gomma arabica, magnesio stearato, polimero acrilico (Eudragit L), olio di ricino, acido silicico, saccarosio, talco, titanio biossido, lacca Kepal.

Descrizione dell'aspetto di Reparilexin e contenuto della confezione

Confezione da 30 Compresse rivestite.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Viatris Healthcare Limited, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, DUBLIN, Irlanda

Produttore

Madaus GmbH Luetticher Strasse, 5 Troisdorf - Colonia Germania

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: Luglio 2022