

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

CONDROSULF 400 mg capsule rigide CONDROSULF 400 mg granulato per soluzione orale condroitin-solfato sodico

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al suo medico. Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al suo medico. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è CONDROSULF e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere CONDROSULF
3. Come prendere CONDROSULF
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare CONDROSULF
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è CONDROSULF e a cosa serve

CONDROSULF è un medicinale usato per il trattamento delle deformazioni derivanti dalla degradazione delle articolazioni (osteoartrosi) del ginocchio e dell'anca; il suo principio attivo è il condroitin-solfato, che è il componente principale della cartilagine.

CONDROSULF allevia i dolori articolari e migliora la mobilità delle articolazioni.

2. Cosa deve sapere prima di prendere CONDROSULF

Non prenda CONDROSULF se:

- è allergico al principio attivo o ad altre sostanze simili dal punto di vista chimico, o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

CONDROSULF deve essere usato con cautela nei soggetti particolarmente a rischio di allergie.

Informi il medico o il farmacista prima di prendere questo medicinale se soffre di allergie.

CONDROSULF granulato per soluzione orale contiene:

- 1335 mg di sorbitolo per bustina. Sorbitolo è una fonte di fruttosio. Se il medico le ha detto che lei è intollerante ad alcuni zuccheri, o se ha una diagnosi di intolleranza ereditaria al fruttosio, una rara malattia genetica per cui i pazienti non riescono a trasformare il fruttosio, parli con il medico prima che lei prenda questo medicinale.
- giallo arancio S (E 110). Può causare reazioni allergiche.
- 38 mg di sodio (componente principale del sale da cucina) per bustina. Questo equivale a 1.9% dell'assunzione massima giornaliera raccomandata con la dieta di un adulto.

CONDROSULF capsule rigide contiene 36.5 mg di sodio (componente principale del sale da cucina) per capsula. Questo equivale a 1.8% dell'assunzione massima giornaliera raccomandata con la dieta di un adulto.

Bambini e adolescenti

CONDROSULF non è raccomandato nei bambini e negli adolescenti con meno di 18 anni di età.

Altri medicinali e CONDROSULF

Non sono note interazioni tra CONDROSULF ed altri farmaci. Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Gravidanza e allattamento

Questo medicinale deve essere usato in gravidanza o allattamento solo nei casi di effettiva necessità e sotto stretto controllo medico.

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno, consulti il medico che valuterà vantaggi e rischi della terapia con CONDROSULF.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

CONDROSULF non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

3. Come prendere CONDROSULF

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico, che stabilirà la dose e la durata del trattamento. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Adulti

Se non diversamente indicato dal medico, la dose abituale è di:

2 - 3 capsule o bustine al giorno, per almeno 3 settimane.

Assuma CONDROSULF per bocca:

- se utilizza CONDROSULF capsule, deglutisca le capsule con acqua;
- se utilizza CONDROSULF granulato, sciogla il contenuto delle bustine in acqua prima dell'assunzione.

Non modifichi la dose raccomandata o prescritta dal medico. Se non nota miglioramenti o nota un peggioramento dei sintomi, informi il medico o il farmacista.

Se prende CONDROSULF più di quanto deve

Non sono noti casi di sovradosaggio. Si consiglia di non superare il dosaggio suggerito.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva contattare immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Durante il trattamento con CONDROSULF possono manifestarsi i seguenti effetti indesiderati:

Effetti indesiderati rari (che possono interessare fino a 1 persona su 1.000):

- disturbi allo stomaco o all'intestino, dolore all'addome, nausea, diarrea;
- comparsa più o meno improvvisa di lesioni della pelle, ad esempio cambiamenti di colore a macchie o diffusi (esantema maculo-papulare, eritema, eruzione cutanea);
- vertigini.

Effetti indesiderati molto rari (che possono interessare fino a 1 persona su 10.000):

- arrossamento della pelle (eczema), orticaria, prurito;
- gonfiore (edema).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo "<https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>". Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare CONDROSULF

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale non richiede condizioni particolari di conservazione.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene CONDROSULF

Il principio attivo è: condroitin-solfato sodico.

CONDROSULF capsule rigide

Ogni capsula contiene 400 mg di condroitin-solfato sodico.

Gli altri componenti sono: magnesio stearato, gelatina, giallo di chinolina (E104), indigotina (E 132).

CONDROSULF granulato per soluzione orale

Ogni bustina di granulato contiene 400 mg di condroitin-solfato sodico.

Gli altri componenti sono: acido citrico, aroma arancio, saccarina sodica, giallo arancio S (E 110), sorbitolo, silice colloidale anidra (Aerosil 200).

Descrizione dell'aspetto di CONDROSULF e contenuto della confezione

CONDROSULF capsule rigide è disponibile in confezione contenente 20 capsule.

CONDROSULF granulato per soluzione orale è disponibile in confezione contenente 20 bustine.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., Via Martiri di Cefalonia, 2, 26900 Lodi

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 02/2022.