

Foglio Illustrativo: INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE

Definizione stile: Normale

LUCEN 20 mg compresse gastroresistenti
LUCEN 40 mg compresse gastroresistenti
esomeprazolo

2. PRIMA DI PRENDERE LUCEN

(...)

Eruzione cutanea e reazioni della pelle

(...)

Si sono verificate gravi eruzioni cutanee in pazienti che assumevano esomeprazolo (vedere anche paragrafo 4). L'eruzione cutanea può comportare ulcere della bocca, della gola, del naso, dei genitali e congiuntivite (occhi rossi e gonfi). Queste gravi eruzioni cutanee spesso si verificano dopo sintomi simil-influenzali come febbre, mal di testa, dolori muscolari. L'eruzione cutanea può coprire ampie parti del corpo con formazione di vesciche e desquamazione della pelle.

Se in qualsiasi momento durante il trattamento (anche dopo diverse settimane) sviluppa un'eruzione cutanea o uno qualsiasi di questi sintomi cutanei, interrompa l'assunzione di questo medicinale e contatti immediatamente il medico.

4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Se dovesse notare qualcuno dei seguenti effetti indesiderati gravi, smetta di prendere LUCEN e contatti immediatamente il medico:

- Pelle gialla, urine scure e stanchezza che possono essere sintomi di problemi al fegato. Questi effetti sono rari e possono interessare fino a 1 persona su 1.000.
- Sibilo respiratorio improvviso, gonfiore delle labbra, della lingua e della gola o del corpo, eruzione cutanea, senso di svenimento o difficoltà nel deglutire (reazione allergica severa). Questi effetti sono rari e possono interessare fino a 1 persona su 1.000.
- Arrossamento ~~Insorgenza improvvisa di una grave eruzione cutanea o arrossamento~~ della pelle con vesciche o desquamazione. si possono verificare anche dopo diverse settimane di trattamento. Possono anche comparire gravi vesciche e sanguinamenti nelle labbra, negli occhi, nella bocca, nel naso e nei genitali. Le eruzioni cutanee possono trasformarsi in gravi danni cutanei diffusi (desquamazione dell'epidermide e delle mucose superficiali) con conseguenze potenzialmente letali. Questo può essere la 'eritema multiforme', "sindrome di Stevens-Johnson" o "necrolisi epidermica tossica" o 'reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici'. Questi effetti sono rari e possono interessare fino a 1 persona su 10.000.
- ~~Pelle gialla, urine scure e stanchezza possono essere sintomi di problemi al fegato.~~

Formattato: Rientro: Sinistro: 0,63 cm, Sporgente 0,37 cm, Tabulazioni: 1 cm, Tabulazione elenco + Non a 1,27 cm

Formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

~~Questi effetti sono rari, riguardano meno di 1 persona su 1000.~~

Formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

Altri effetti indesiderati includono:

(...)

Molto rari (riguardano meno di 1 persona su 10.000):

(...)

- Comparsa improvvisa di grave eruzione cutanea o vesciche o desquamazione della pelle. Ciò può essere associato a febbre alta e dolore alle articolazioni (eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi epidermica tossica, reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici).

(...)

6. ALTRE INFORMAZIONI

Questo foglio illustrativo è stato approvato l'ultima volta il: Agosto 2022-Settembre 2022