

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

TORASEMIDE HEXAL 10 mg compresse

torasemide

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è Torasemide Hexal e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Torasemide Hexal
3. Come prendere Torasemide Hexal
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Torasemide Hexal
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Torasemide Hexal e a cosa serve

TORASEMIDE HEXAL 10 mg compresse è usato per trattare:

- **il gonfiore causato dall'eccesso di acqua nel corpo (edema).**

Torasemide è un diuretico, un tipo di medicinale che aumenta la quantità di urina prodotta.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Torasemide Hexal

Non prenda Torasemide Hexal se è/soffre di

- **allergico a:**
 - **torasemide** o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6)
 - medicinali simili chiamati "sulfaniluree" utilizzati per trattare gli alti livelli di zucchero nel sangue, contenenti principi attivi con nomi che terminano per lo più in "-mide"
- **insufficienza renale** con insufficiente produzione di urina
- **disturbi epatici gravi** con perdita di coscienza
- **bassa pressione sanguigna**
- **diminuzione del volume di sangue**
- **allattamento**
- **riduzione dei livelli di potassio o di sodio nel sangue**
- **gravi disturbi urinari causati** ad esempio da una ghiandola prostatica ingrossata

- **gotta**
- **battito cardiaco irregolare**
- **assunzione di medicinali usati per trattare le infezioni**, come cefixima, cefuroxima, cefaclor, cefalexina, cefadroxil, cefpodoxima proxetil, canamicina, neomicina, gentamicina, amicacina o tobramicina
- **ridotta funzionalità renale** a causa di medicinali che causano danni ai reni

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico prima di prendere Torasemide Hexal, se una qualsiasi delle seguenti situazioni la riguardano:

- cambiamenti anomali nella quantità di acidi e di basi nel corpo
- cambiamenti anomali dei livelli del sangue
- diabete

assunzione di litio, un medicinale per trattare la depressione.

Se deve prendere torasemide per un lungo periodo di tempo, il medico controllerà regolarmente i livelli del sangue, specialmente se sta assumendo altri medicinali, se ha il diabete o soffre di aritmie.

Bambini e adolescenti

Torasemide Hexal non è raccomandato nei bambini e adolescenti di età inferiore a 18 anni.

Altri medicinali e Torasemide Hexal

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

I seguenti medicinali possono influenzare o essere influenzati da Torasemide Hexal:

- **medicinali per il trattamento della pressione alta del sangue**, in particolare i medicinali contenenti principi attivi che terminano in "-pril"
- medicinali per aumentare forza di pompaggio del cuore, come la **digitossina, digossina o metildigossina**
- **medicinali per il trattamento del diabete**
- **probenecid**, un medicinale per il trattamento della gotta
- **medicinali per trattare l'infiammazione e il dolore**, come l'acido acetilsalicilico o indometacina
- **sulfasalazina, mesalazina o olsalazina**, medicinali per il trattamento di malattie infiammatorie croniche intestinali
- **medicinali per il trattamento di infezioni**, come cefixima, cefuroxima, cefaclor, cefalexina, cefadroxil, cefpodoxime proxetil, kanamicina, neomicina, gentamicina, amikacina o tobramicina
- **composti a base di platino**, come cisplatino, (un medicinale per il trattamento del cancro)
- **litio**, un medicinale per il trattamento della depressione
- **teofillina**, un medicinale per il trattamento dell'asma
- alcuni **medicinali rilassanti muscolari** con principi attivi che terminano in "-curonium" o "-curium"
- **tutti i medicinali per trattare la stitichezza**
- **medicinali contenenti cortisone**, come l'idrocortisone, prednisone o prednisolone
- **colestiramina**, un medicinale per ridurre i livelli di grassi nel sangue
- **adrenalina o noradrenalina**, medicinali per aumentare la pressione sanguigna
- **warfarin**, un medicinale per trattare la coagulazione del sangue.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza o allattamento, se sospetta una gravidanza o sta pianificando di avere un bambino, chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

- **Gravidanza**

Prenda Torasemide Hexal durante la gravidanza solo **se il medico indica che è assolutamente necessario**. In questo caso deve usare la **dose più bassa possibile**.

- **Allattamento**

Torasemide Hexal non deve essere usato dalle donne che allattano in quanto può essere dannoso per il bambino.

Guida di veicoli e uso di macchinari

Possono verificarsi vertigini o sonnolenza durante l'assunzione di Torasemide Hexal specialmente all'inizio del trattamento, quando la dose viene aumentata, nel caso in cui venga cambiata la terapia, quando si inizia una terapia con un medicinale aggiuntivo o quando il medicinale viene ingerito in concomitanza con alcool.

Se la sua attenzione diminuisce, non guidi o usi macchinari.

Torasemide Hexal contiene lattosio

Questo medicinale contiene lattosio, un tipo di zucchero. Se il medico le ha diagnosticato una **intolleranza ad alcuni zuccheri**, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping.

3. Come prendere Torasemide Hexal

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La **dose raccomandata** è:


Trattamento del gonfiore causato dall'eccesso di acqua nel corpo (edema).

- **mezza compressa una volta al giorno**

Se necessario, il medico può aumentare gradualmente la dose fino a 2 compresse una volta al giorno.

Per dividere la compressa:

La compressa può essere divisa in due dosi uguali.



Posizioni la compressa su una superficie piana e dura con la linea di frattura rivolta verso l'alto. Prema con un dito su ciascuno lato della linea di frattura a sinistra e a destra, e la compressa si divide in due metà uguali.

Uso nei bambini e adolescenti

Non c'è esperienza sufficiente sull'uso di torasemide nei bambini e adolescenti, pertanto l'uso di questo medicinale non è raccomandato nei bambini e adolescenti di età inferiore a 18 anni.

Ridotta funzionalità epatica, non grave

Il medico valuterà con attenzione come potrebbe aumentare la dose nel sangue di torasemide.

Modo di somministrazione

Prenda le compresse **ogni mattina** indipendentemente dai pasti, senza masticarle, con 100 ml di acqua, equivalente a un mezzo bicchiere.

Durata del trattamento

La durata del trattamento è decisa dal medico curante. Torasemide Hexal può essere utilizzato continuativamente per alcuni anni o fino a quando l'eccesso di liquidi nei tessuti scompare.

Se prende più Torasemide Hexal di quanto deve

Contatti immediatamente il medico.

Un sovradosaggio può causare elevata produzione di urina, sonnolenza, confusione, debolezza, vertigini, ipotensione, collasso circolatorio, disturbi di stomaco.

Porti sempre con sé questo foglio, il medicinale rimanente e il relativo contenitore, in modo da consentire una più agevole individuazione di quale medicinale è stato preso.

Se si dimentica di prendere Torasemide Hexal

Prenda la dose dimenticata non appena possibile nello stesso giorno o prenda la dose successiva normalmente il giorno successivo. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento Torasemide Hexal

Non interrompa l'uso di torasemide senza il consenso dei medici, poichè questo può seriamente danneggiarla e ridurre l'effetto della terapia.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4 Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Gli effetti indesiderati possono verificarsi con la seguente frequenza:

Comune, possono interessare fino a 1 persona su 10:

- disturbi nella quantità di acqua e sali minerali nell'organismo, specialmente se assume pochi sali
- eccessiva alcalosi dell'organismo
- crampi muscolari,
- aumento delle concentrazioni di acido urico, zucchero e grassi nel sangue
- riduzione dei livelli di potassio e sodio nel sangue
- riduzione del volume di sangue
- disturbi dello stomaco e/o intestino, come perdita dell'appetito, dolore di stomaco, nausea (malessere), vomito, diarrea, stitichezza
- aumento dei livelli di alcuni enzimi epatici, come gamma-GT
- mal di testa

- vertigini
- stanchezza
- debolezza

Non comune, possono interessare fino a 1 persona su 100:

- aumento delle concentrazioni urea e creatinina nel sangue
- secchezza della bocca
- sensazione di avere i brividi o formicolio nelle braccia e gambe
- difficoltà ad urinare (ad esempio causata dall'ingrossamento della prostata)

Molto raro, possono interessare fino a 1 persona su 10000:

- vasi sanguigni ristretti o compressi a causa di un peggioramento della fluidità del sangue
- pressione sanguigna più bassa del normale
- problemi di circolazione, soprattutto quando sta in piedi
- battito cardiaco irregolare
- angina pectoris, una condizione spesso caratterizzata da grave dolore al petto
- attacco di cuore
- svenimento
- infiammazione del pancreas
- reazioni allergiche con prurito e reazioni cutanee
- aumento della sensibilità della pelle alla luce
- gravi reazioni cutanee
- riduzione dei globuli rossi, dei globuli bianchi e delle piastrine
- disturbi visivi
- tintinnio o ronzio nelle orecchie
- perdita dell'udito

Non nota: la frequenza non può essere stabilita in base ai dati disponibili

- flusso di sangue insufficiente al cervello
- confusione

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Torasemide Hexal

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sul blister e sulla scatola dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedere al farmacista come eliminare i medicinali che non si utilizzano più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Torasemide Hexal

- **Il principio attivo è torasemide.**
Ogni compressa contiene 10 mg di torasemide.
- Gli altri componenti sono
cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, silice colloidale anidra

Descrizione dell'aspetto di Torasemide Hexal e contenuto della confezione

La compressa di Torasemide Hexal è rotonda, di colore da bianco a biancastro, con incisione di frattura a croce.

Confezioni:

10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100, 400 (20x20) compresse

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Sandoz S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1

21040 Origgio (VA)

Produttori

SALUTAS Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee, 1

39179 Barleben (Germania)

LEK S.A.

Podlipie Str. 16

95-010 Strykow

Polonia

LEK S.A.

50C, Domaniewska Street

02-672 Warszawa

Polonia

Questo medicinale è stato autorizzato negli stati membri dell'EEA con le seguenti denominazioni:

Belgio	Torasemide Sandoz 5 mg tabletten
	Torasemide Sandoz 10 mg tabletten
	Torasemide Sandoz 20 mg tabletten
Bulgaria	Torazidex 5 mg tablets
	Torazidex 10 mg tablets
Germania	Torasemid Sandoz 2,5 mg Tabletten

	Torasemid Sandoz 5 mg Tabletten
	Torasemid Sandoz 10 mg Tabletten
	Torasemid Sandoz 20 mg Tabletten
Estonia	Torasemid HEXA
Latvia	Torasemide Hexal 10 mg tabletes
Lituania	Toridium 10 mg tabletės
Svezia	Torahexal

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: 02/2022
