

Enalapril Mylan Generics 5 mg compresse
Enalapril Mylan Generics 20 mg compresse

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente
Enalapril Mylan Generics 5 mg compresse
Enalapril Mylan Generics 20 mg compresse

enalapril maleato

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone anche se i loro sintomi sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è Enalapril Mylan Generics e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Enalapril Mylan Generics
3. Come prendere Enalapril Mylan Generics
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Enalapril Mylan Generics
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Enalapril Mylan Generics e a cosa serve

Le compresse contengono un principio attivo chiamato enalapril maleato. Questo principio attivo appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati ACE inibitori (inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina).

Enalapril Mylan Generics è usato

- per trattare la pressione sanguigna alta (ipertensione).
- Per trattare l'insufficienza cardiaca (indebolimento della funzione cardiaca). Può ridurre la necessità di andare in ospedale e può aiutare alcuni pazienti a vivere più a lungo.
- Per prevenire i segni dell'insufficienza cardiaca. I segni comprendono: respiro corto, stanchezza dopo attività fisica leggera quale camminare, o gonfiore delle caviglie e dei piedi.

Questo medicinale agisce dilatando i suoi vasi sanguigni. Ciò abbassa la sua pressione sanguigna. Il medicinale solitamente inizia ad agire entro un'ora, e l'effetto dura per almeno 24 ore. Alcune persone necessiteranno di diverse settimane di trattamento prima che possa vedersi l'effetto massimo sulla pressione sanguigna.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Enalapril Mylan Generics

Non prenda Enalapril Mylan Generics

- se è in gravidanza da più di 3 mesi (è preferibile evitare l'assunzione di Enalapril Mylan Generics anche nella fase iniziale della gravidanza – vedere paragrafo Gravidanza)
- se è allergico all'enalapril maleato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6)
- se ha avuto in precedenza una reazione allergica con un medicinale di tipo simile a questo medicinale chiamato ACE inibitore
- se ha avuto in precedenza gonfiore di viso, labbra, bocca, lingua o gola che ha causato difficoltà a deglutire o respirare (angioedema), la cui ragione non è nota o se è ereditario

- se ha assunto o sta assumendo sacubitril/valsartan, un medicinale usato per trattare un tipo di insufficienza cardiaca a lungo termine (cronica) negli adulti, in quanto ciò aumenta il rischio di angioedema (rapido rigonfiamento sotto la pelle in zone come la gola)
- se soffre di diabete o la sua funzione renale è compromessa ed è in trattamento con un medicinale che abbassa la pressione del sangue contenente aliskiren.

Se qualcuna delle condizioni sopra riportate la riguarda, non prenda questo medicinale. Se ha dei dubbi ne parli con il medico o il farmacista prima di prendere questo medicinale.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Enalapril Mylan Generics se:

- ha un problema al cuore
- ha una condizione che coinvolge i vasi sanguigni nel cervello
- ha un problema del sangue quale basso numero o mancanza di globuli bianchi (neutropenia/agranulocitosi), basso numero di piastrine (trombocitopenia) o riduzione del numero dei globuli rossi (anemia)
- ha un problema al fegato
- ha un problema ai reni, (incluso il trapianto di rene), segue una dieta povera di sale, sta assumendo integratori di potassio, agenti risparmiatori di potassio, sostituti del sale contenenti potassio o altri farmaci che possono aumentare il potassio nel sangue (ad es. eparina [un medicinale usato per prevenire la formazione di coaguli di sangue], prodotti contenenti trimetoprim come il cotrimoxazolo [medicinali usati per trattare le infezioni]). Questo può portare ad un aumento dei livelli di potassio nel sangue che può essere rischioso. Il medico potrebbe ritenere necessario modificare la dose di Enalapril Mylan Generics o di monitorare i suoi livelli ematici di potassio. Vedere anche quanto riportato al paragrafo “Altri medicinali ed Enalapril Mylan Generics”
- è in dialisi
- ha avuto di recente episodi di vomito eccessivo o forte diarrea
- soffre di una malattia vascolare del collagene, (ad es. lupus eritematoso, artrite reumatoide o sclerodermia), sta facendo una terapia che sopprime il sistema immunitario, sta prendendo i medicinali allopurinolo o procainamide, o loro combinazioni in quanto possono aumentare il rischio di ridurre il numero di globuli bianchi nel sangue.
- sta assumendo uno dei seguenti medicinali, il rischio di angioedema può aumentare:
 - racecadotril, un medicinale usato per trattare la diarrea
 - medicinali usati per prevenire il rigetto di trapianti d'organo e per curare il cancro (ad es. temsirolimus, sirolimus, everolimus)
 - vildagliptin, un medicinale usato per il trattamento del diabete
- ha avuto in passato una reazione allergica con gonfiore del volto, delle labbra, della lingua o della gola con difficoltà ad ingoiare o nella respirazione. Deve sapere che i pazienti neri hanno un rischio maggiore di sviluppare questo tipo di reazioni agli ACE inibitori.
- soffre di pressione bassa (ci si accorge di questo quando si ha una sensazione di svenimento o di capogiro, specialmente quando si sta in piedi)
- ha il diabete. Deve monitorare i livelli di glucosio nel sangue, specialmente durante il primo mese di trattamento. Il livello di potassio nel sangue può anche essere più alto
- sta assumendo uno dei seguenti medicinali usati per trattare la pressione alta del sangue:
 - un “antagonista del recettore dell’angiotensina II” (AIIRA) (anche noti come sartani per esempio valsartan, telmisartan, irbesartan, ecc.), in particolare se soffre di problemi renali correlati al diabete
 - aliskiren.

Il medico può controllare la sua funzionalità renale, la pressione del sangue e la quantità di elettroliti (ad esempio il potassio) nel sangue ad intervalli regolari.

Vedere anche quanto riportato al paragrafo “Non prenda Enalapril Mylan Generics”.

Deve informare il medico se pensa di essere in stato di gravidanza (o se vi è la possibilità di dare inizio a una gravidanza). Questo medicinale non è raccomandato all'inizio della gravidanza e non deve essere preso se lei è in stato di gravidanza da più di 3 mesi, poiché esso può causare grave danno al bambino se preso in questo periodo (vedere paragrafo Gravidanza).

Deve sapere che nei pazienti neri questo medicinale riduce la pressione sanguigna in modo meno efficace rispetto ai pazienti non neri.

Se lei non è sicuro che qualcuna delle condizioni sopra riportate la riguardi, si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale

Sesta per essere sottoposto ad una procedura

Se sta per essere sottoposto ad una delle seguenti procedure, informi il medico che sta prendendo Enalapril Mylan Generics:

- intervento chirurgico o necessità di ricevere anestetici (anche dal dentista)
- trattamento che rimuove il colesterolo dal sangue detto “LDL aferesi”
- trattamento desensibilizzante per ridurre gli effetti di un’allergia alle punture di api e vespe.

Se qualcuna delle condizioni sopra riportate la riguarda, parli con il medico o con il dentista prima della procedura.

Bambini e adolescenti Le informazioni relative all’uso di enalapril maleato nei bambini di età superiore ai 6 anni affetti da pressione sanguigna alta sono scarse, mentre per i bambini con problemi di cuore tali informazioni non sono disponibili.

Nei bambini enalapril dovrebbe essere usato solo in caso di pressione sanguigna elevata (ipertensione). Enalapril maleato non deve essere usato in neonati o bambini con ridotta funzionalità renale.

Altri medicinali e Enalapril Mylan Generics

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Sono compresi i medicinali a base di erbe. Questo perché Enalapril Mylan Generics può interferire con il meccanismo d'azione di alcuni medicinali. Inoltre, alcuni medicinali possono interferire con il meccanismo d'azione di Enalapril Mylan Generics. Il medico può ritenere necessario modificare la dose e/o prendere altre precauzioni.

In particolare informi il medico o il farmacista se sta prendendo uno dei seguenti medicinali:

- sta assumendo un antagonista del recettore dell’angiotensina II (AIIRA) o aliskiren (vedere anche quanto riportato al paragrafo: “Non prenda Enalapril Mylan Generics” e “Avvertenze e precauzioni”).
- altri medicinali per abbassare la pressione sanguigna, quali beta-bloccanti o diuretici
- integratori del potassio (inclusi sostituti del sale), diuretici risparmiatori del potassio e altri medicinali che potrebbero aumentare la quantità di potassio presente nel sangue (come trimetoprim e cotrimossazolo per trattare infezioni provocate da batteri; ciclosporina, un medicinale immunosoppressore usato per prevenire il rigetto degli organi trapiantati; ed eparina, un medicinale usato per fluidificare il sangue e prevenire la formazione di coaguli). Vedere anche quanto riportato nel paragrafo “Avvertenze e precauzioni”
- medicinali per il diabete (compresi antidiabetici orali e insulina)
- litio (un medicinale usato per trattare un certo tipo di depressione). Enalapril Mylan Generics non deve essere assunto con questo medicinale in quanto può aumentare i livelli di litio nel sangue.
- medicinali per la depressione chiamati “antidepressivi triciclici”
- medicinali per problemi mentali chiamati “antipsicotici”
- alcuni medicinali per tosse e raffreddore e medicinali che riducono il peso corporeo che contengono un cosiddetto “agente simpaticomimetico”
- alcuni medicinali per dolore o artrite inclusa la terapia con sali d'oro
- un inibitore di mTOR (ad es., temsirolimus, sirolimus, everolimus; medicinali usati per trattare alcuni tipi di cancro o per prevenire il rigetto di un organo trapiantato da parte del sistema

immunitario dell'organismo). Vedere anche le informazioni contenute nel paragrafo “Avvertenze e precauzioni”

- un medicinale contenente un inibitore della neprilisina come sacubitril (disponibile come associazione a dose fissa con valsartan), racecadotril o vildagliptin. Il rischio di angioedema (gonfiore del viso, delle labbra, della lingua o della gola con difficoltà a deglutire o respirare) può essere aumentato. Vedere anche le informazioni contenute nei paragrafi “Non prenda Enalapril Mylan Genetics” e “Avvertenze e precauzioni”
- medicinali antinfiammatori non-steroidi, inclusi gli inibitori della COX-2 (medicinali che riducono l'infiammazione, e che possono essere usati per aiutare ad alleviare il dolore)
- aspirina (acido acetilsalicilico)
- medicinali usati per dissolvere i coaguli del sangue (trombolitici)
- alcol.

Se non è sicuro che una delle condizioni citate in precedenza possa riguardarla, ne parli con il medico o con il farmacista prima di prendere Enalapril Mylan Generics.

Enalapril Mylan Generics con cibi, bevande ed alcol

Enalapril Mylan Generics può essere assunto con o senza cibo. La maggior parte delle persone prende Enalapril Mylan Generics con un bicchiere d'acqua.

L'assunzione contemporanea di alcol con Enalapril Mylan Generics può causare una notevole caduta della pressione arteriosa.

Gravidanza e allattamento

Gravidanza

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico prima di prendere questo medicinale. Il medico di norma le consiglierà di interrompere il trattamento con enalapril maleato prima di iniziare una gravidanza o non appena scopre di essere incinta e le prescriverà un altro medicinale in sostituzione a enalapril maleato. Questo medicinale non è raccomandato nei primi stadi della gravidanza e non deve essere assunto a partire dal terzo mese di gravidanza, dal momento che può danneggiare il suo bambino se assunto dopo il terzo mese di gravidanza.

Allattamento

Informi il medico se sta allattando o se deve iniziare l'allattamento al seno. L'allattamento di neonati (prime settimane dopo la nascita) e specialmente di neonati prematuri non è raccomandato durante il trattamento con questo medicinale. Il medico la informerà sui benefici e sui rischi derivanti dall'assunzione di questo medicinale durante l'allattamento in neonati più maturi, rispetto ad altri trattamenti.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Durante l'assunzione di questo medicinale possono verificarsi capogiro o sonnolenza. Se ciò si verifica, non guidi o non utilizzi alcuno strumento o macchinario.

Enalapril Mylan Generics contiene lattosio

Enalapril Mylan Generics contiene lattosio, che è un tipo di zucchero. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, parli con il suo medico prima di prendere questo medicinale.

Enalapril Mylan Generics contiene sodio

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol di sodio (23 mg) per compressa, cioè è essenzialmente “senza sodio”.

3. Come prendere Enalapril Mylan Generics

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

- È molto importante continuare a prendere questo medicinale fino a quando viene prescritto dal medico.
- Non assumere più compresse di quelle prescritte.
- La linea d'incisione serve ad agevolare la rottura della compressa se ha difficoltà a ingerirla intera e non per dividerla in dosi uguali.

Pressione sanguigna alta

- La dose iniziale abituale varia da 5 a 20 mg in monosomministrazione giornaliera.
- Alcuni pazienti possono aver bisogno di iniziare il trattamento con una dose inferiore.
- La dose abituale di mantenimento è di 20 mg in monosomministrazione giornaliera.
- La dose massima di mantenimento è di 40 mg in monosomministrazione giornaliera.

Nel caso in cui sia in trattamento con un'alta dose di diuretici, il medico può chiederle di interromperne l'assunzione 2-3 giorni prima di prendere Enalapril Mylan Generics.

Insufficienza cardiaca

- La dose iniziale abituale è di 2,5 mg in monosomministrazione giornaliera.
- Il medico aumenterà gradualmente la dose fino a raggiungere la dose appropriata a lei.
- La dose abituale di mantenimento è di 20 mg al giorno, assunta in una o due somministrazioni.
- La dose massima di mantenimento è di 40 mg al giorno, suddivisa in due somministrazioni.

Pazienti con problemi renali

La dose del medicinale varierà in base alla funzionalità dei suoi reni:

- problemi renali di moderata entità - da 5 a 10 mg al giorno,
- problemi renali di grave entità - 2,5 mg al giorno,
- se è in dialisi - 2,5 mg al giorno. Nei giorni in cui non è sottoposto a dialisi, la dose può essere variata in funzione della sua pressione sanguigna.

Pazienti anziani

La dose sarà stabilita dal medico e dovrà essere aggiustata a seconda di quanto bene lavorino i suoi reni.

Uso nei bambini

L'esperienza circa l'uso di Enalapril Mylan Generics nei bambini con pressione sanguigna alta è limitata. Se il bambino è in grado di deglutire le compresse la dose dovrà essere determinata in funzione del suo peso e della sua risposta pressoria. Le dosi iniziali abituali sono:

- peso compreso tra 20 kg e 50 kg - 2,5 mg al giorno,
- peso superiore a 50 kg - 5 mg al giorno.

La dose può essere modificata secondo i bisogni del bambino:

- una dose massima di 20 mg al giorno può essere usata in bambini con peso compreso tra 20 kg e 50 kg,
- una dose massima di 40 mg al giorno può essere usata in bambini con peso superiore a 50 kg.

Questo medicinale non è raccomandato nei neonati (prime settimane di vita) e nei bambini con problemi renali.

Se prende più Enalapril Mylan Generics di quanto deve

Se prende più Enalapril Mylan Generics di quanto deve, informi il medico o vada immediatamente in ospedale. Porti con sé la confezione del medicinale. Possono verificarsi i seguenti effetti: sensazione di leggerezza di testa o vertigine (questo è dovuto a una improvvisa o eccessiva diminuzione della pressione sanguigna) battito cardiaco accelerato o rallentato, ansia, tosse, insufficienza renale e respirazione accelerata.

Se dimentica di prendere Enalapril Mylan Generics

- Se dimentica di prendere una compressa, salti la dose dimenticata.
- Prenda la dose successiva come sempre.
- Non assuma una dose doppia per compensare la dimenticanza di una dose.

Se interrompe il trattamento con Enalapril Mylan Generics

Non smetta di prendere questo farmaco, a meno che non sia il suo medico a dirle di farlo.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino. Con questo medicinale sono stati segnalati i seguenti effetti indesiderati:

Interrompa il trattamento con Enalapril Mylan Generics e contatti immediatamente un medico, se nota una qualsiasi delle seguenti manifestazioni:

- gonfiore del viso, delle labbra, della lingua o della gola che può causare difficoltà della respirazione o della deglutizione
- gonfiore delle mani, dei piedi o delle caviglie
- sviluppo di una eruzione cutanea con formazioni rosse in rilievo (orticaria).

Deve sapere che i pazienti di razza nera hanno un rischio maggiore di sviluppare questo tipo di reazioni. Se nota la comparsa di una qualsiasi di queste manifestazioni, interrompa il trattamento con Enalapril Mylan Generics e contatti immediatamente il medico.

Quando inizia ad assumere questo medicinale può avvertire senso di svenimento o capogiro. Se ciò accade, potrà essere utile sdraiarsi. Questo è causato dall'abbassamento della pressione sanguigna. Dovrebbe migliorare continuando ad assumere il medicinale. Se è preoccupato contatti il medico.

Altri effetti indesiderati comprendono:

Molto comune (può interessare più di 1 persona su 10)

- sensazione di malessere (nausea) vertigini, debolezza
- visione offuscata
- tosse

Comune (può interessare fino a 1 persona su 10)

- Mal di testa, depressione, svenimento (sincope), alterazione del senso del gusto
- Sensazione di testa leggera dovuta a pressione del sangue bassa), variazioni del ritmo cardiaco, battito cardiaco accelerato, angina o dolore toracico
- Dolore al torace
- Respiro corto
- Diarrea, dolore addominale
- Stanchezza (affaticamento)
- Eruzione cutanea, reazioni allergiche con gonfiore del viso, delle labbra, della lingua o della gola con difficoltà della respirazione o della deglutizione
- Elevati livelli di potassio nel sangue, aumento dei livelli della creatinina nel sangue (entrambi sono rilevati con un esame del sangue)

Non comune (può interessare fino a 1 persona su 100)

- rossore
- improvvisa riduzione della pressione sanguigna
- battiti cardiaci accelerati o irregolari (palpitazioni)

- attacco di cuore (verosimilmente dovuto a pressione sanguigna molto bassa in alcuni pazienti ad alto rischio, inclusi quelli con problemi circolatori a livello del cuore o del cervello)
- ictus (verosimilmente dovuto a pressione sanguigna molto bassa in pazienti ad alto rischio)
- anemia (inclusa anemia aplastica ed emolitica)
- confusione, insonnia o sonnolenza, nervosismo
- sensazione di formicolio o insensibilità a livello della pelle
- vertigini (sensazione di capogiro)
- ronzio nelle orecchie (tinnito)
- secrezione nasale, mal di gola o raucedine
- asma associata a oppressione toracica
- rallentato transito del cibo nell'intestino (ileo), infiammazione del pancreas
- vomito, indigestione, stitichezza, anoressia
- irritazione gastrica, bocca secca, ulcera
- crampi muscolari
- compromissione della funzione renale, insufficienza renale
- aumento della sudorazione
- prurito o orticaria
- perdita dei capelli
- sensazione generale di malessere, temperatura corporea alta (febbre)
- alto livello di proteine nelle urine (generalmente rivelata con un test delle urine)
- impotenza
- basso livello di zucchero o di sodio nel sangue, elevato livello di urea nel sangue (tutti rivelati con esami del sangue)

Raro (può interessare fino a 1 persona su 1.000)

- “fenomeno di Raynaud” in cui mani e piedi possono diventare molto freddi e bianchi a causa di un basso flusso di sangue
- variazioni nei valori del sangue quali diminuzione del numero dei globuli bianchi e dei globuli rossi, diminuzione dell'emoglobina, diminuzione del numero delle piastrine
- depressione del midollo osseo
- ingrossamento delle ghiandole di collo, ascelle e inguine
- malattie autoimmunitarie
- sogni strani o disturbi del sonno
- accumulo di liquidi o di altre sostanze nei polmoni (evidenziato da radiografia)
- infiammazione del naso
- infiammazione dei polmoni che causa difficoltà respiratoria (polmonite)
- infiammazione di guance, gengive, lingua, labbra, gola
- diminuzione del quantitativo di urina
- eruzione cutanea di aspetto simile ad un bersaglio (eritema multiforme)
- “sindrome di Stevens-Johnson” e “necrolisi epidermica tossica” (gravi patologie cutanee nelle quali si ha arrossamento e desquamazione della cute, ulcere bollose o esposte), dermatite esfoliativa/eritroderma (grave eruzione cutanea con desquamazione o esfoliazione dello strato superficiale della cute), pemfigo (piccole bolle sulla cute piene di liquido)
- problemi al fegato o alla cistifellea quali riduzione della funzione del fegato, infiammazione del fegato, ittero (colorazione gialla di cute o occhi), alti livelli degli enzimi del fegato o della bilirubina (misurati con un esame del sangue)
- ingrossamento delle mammelle negli uomini (ginecomastia)

Molto raro (può interessare fino a 1 persona su 1.000)

- gonfiore nell'intestino (angioedema intestinale).

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

- sovrapproduzione di ormone antidiuretico, che causa ritenzione di liquidi, con conseguente debolezza, stanchezza o confusione
- è stato riportato un complesso di sintomi che può includere alcuni o tutti i seguenti: febbre, infiammazione dei vasi sanguigni (sierosite/vasculite), dolore muscolare (mialgia/miosite), dolore alle articolazioni (artralgia/artrite). Possono verificarsi eruzione cutanea, fotosensibilità o altre manifestazioni cutanee.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Enalapril Mylan Generics

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non conservare Enalapril Mylan Generics a temperatura superiore a 25°C. Conservare nella confezione originale.

Non conservi le compresse in un contenitore diverso da quello originale dal momento che potrebbero mescolarsi.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sull'etichetta sulla scatola o sul flacone dopo "Scad.".

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Enalapril Mylan Generics

La sostanza attiva è l'enalapril maleato. Ogni compressa contiene 5 o 20 mg di enalapril maleato.

Gli altri componenti sono sodio idrogeno carbonato, amido pregelatinizzato, amido di mais, lattosio monoidrato (vedere paragrafo 2, "Enalapril Mylan Generics contiene lattosio monoidrato") e magnesio stearato.

Le compresse da 20 mg contengono anche ossido di ferro marrone (E172)

Descrizione dell'aspetto di Enalapril Mylan Generics e contenuto della confezione

Le compresse di Enalapril Mylan Generics 5 mg sono bianche, di forma triangolare, biconvesse, con impresso "5" sopra "G" su un lato e linea di frattura sull'altro lato. Sono lunghe approssimativamente 9 mm, larghe 9 mm e spesse 4 mm.

Le compresse di Enalapril Mylan Generics 20 mg sono di colore pesca, di forma triangolare, biconvesse, con impresso "20" sopra "G" su un lato e linea di frattura sull'altro lato. Sono lunghe approssimativamente 9 mm, larghe 9 mm e spesse 4 mm.

Enalapril Mylan Generics è disponibile nei seguenti formati:

- Blister in Al/Al contenuti in astucci di cartone.

Confezioni da 10, 11, 14, 20, 28, 30, 49, (49 x 1 blister), 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 250 e 500 compresse.

- Flaconi in HDPE (polietilene ad alta densità) contenenti l'essicante e tappo in PP (polipropilene) con chiusura sigillata.

Confezioni da 10, 11, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 250 e 500 compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio e Produttore

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio

Mylan S.p.A., Via Vittor Pisani, 20, 20124 Milano, Italia

Produttore responsabile del rilascio dei lotti

Mc Dermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublino 13, Irlanda

Mylan Hungary Kft., H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Ungheria

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:

IT: Enalapril Mylan Generics

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il Luglio 2022