

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

IBUPROFENE ALTER 400 mg Compresse rivestite con film

IBUPROFENE ALTER 600 mg Compresse rivestite con film

Ibuprofene

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è IBUPROFENE ALTER e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere IBUPROFENE ALTER
3. Come prendere IBUPROFENE ALTER
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare IBUPROFENE ALTER
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è IBUPROFENE ALTER e a che cosa serve

IBUPROFENE ALTER contiene ibuprofene, che appartiene ad una classe di medicinali detti FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei). Questi medicinali agiscono riducendo il dolore e il gonfiore provocati dall'infiammazione e la febbre in condizioni quali:

- osteoartrosi (una malattia degenerativa che interessa le articolazioni) in diverse parti del corpo;
- infiammazione dei muscoli (miosite), dei muscoli e tessuti (fibrosite), dei tendini (tenosinovite), delle radici nervose e dei nervi (radicolo-nevrite) e dei tessuti di natura fibrosa, che circondano l'articolazione (periartrite scapolo-omeroale);
- mal di schiena (lombalgia);
- sciatalgia (dolore alla gamba causata dall'irritazione del nervo sciatico);
- traumatologia sportiva;
- artrite reumatoide (malattia di origine autoimmune progressiva e cronica che colpisce le articolazioni);
- malattia di Still.

IBUPROFENE ALTER si usa per il trattamento di dolori di varia origine e natura (ad esempio traumi o infiammazioni); mal di testa (emicrania, cefalea), mal di denti a seguito di estrazione dei denti o altri interventi, dolori mestruali, dolori che si verificano dopo il parto e dopo operazioni chirurgiche

2. Cosa deve sapere prima di prendere IBUPROFENE ALTER

Non prenda IBUPROFENE ALTER

- se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se ha sofferto di reazioni allergiche quali asma, secrezione abbondante delle vie nasali, eruzioni cutanee pruriginose o gonfiore delle labbra, del volto, della lingua o della gola dopo aver assunto medicinali contenenti acido acetilsalicilico (come l'aspirina) o altri medicinali antidolorifici, antipiretici o antinfiammatori (FANS);

- se ha sofferto di ulcera o di sanguinamento dello stomaco o dell'intestino tenue (duodeno) in relazione all'uso precedente di medicinali antidolorifici o antinfiammatori (FANS);
- se soffre di ulcera o di sanguinamento dello stomaco o dell'intestino tenue (duodeno) o se ha sofferto di due o più episodi di questo tipo;
- se soffre di gravi problemi al fegato, ai reni o al cuore (insufficienza epatica o renale grave, insufficienza cardiaca severa);
- se è negli ultimi tre mesi di gravidanza o se sta allattando al seno (vedere paragrafo “Fertilità, gravidanza e allattamento”);
- se presenta disidratazione significativa (causata da vomito, diarrea o consumo insufficiente di liquidi);
- se la persona che deve prendere il medicinale è un bambino di età inferiore ai 12 anni.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere IBUPROFENE ALTER.

Prenda questo medicinale **con cautela** nelle seguenti situazioni:

- se soffre di lupus eritematoso sistemico (LES);
- se soffre di malattie infiammatorie croniche dell'intestino quali l'infiammazione del colon con ulcere (colite ulcerosa), infiammazioni a carico del tratto digestivo (morbo di Crohn) o altre malattie dello stomaco e dell'intestino;
- se soffre di problemi relativi al normale meccanismo di coagulazione del sangue, in questo caso il medico dovrà tenerla sotto controllo durante il trattamento;
- se soffre di allergie, febbre da fieno, asma, gonfiore cronico della mucosa nasale, dei seni e delle adenoidi o malattie croniche ostruttive delle vie respiratorie, perché è maggiore il rischio di restringimento delle vie respiratorie stesse, con difficoltà di respirazione (broncospasmo). Le reazioni allergiche possono manifestarsi con difficoltà di respirazione (asma), gonfiore al viso (edema di Quincke) e irritazione della pelle (orticaria). Ai primi segni di allergia interrompa il trattamento e si rivolga al medico;
- se soffre di problemi al fegato, ai reni, al cuore o pressione sanguigna elevata.
- se ha un'infezione - vedere paragrafo «Infezioni» di seguito.

Infezioni

IBUPROFENE ALTER può nascondere i sintomi di infezioni quali febbre e dolore. È pertanto possibile che IBUPROFENE ALTER possa ritardare un trattamento adeguato dell'infezione, cosa che potrebbe aumentare il rischio di complicanze. Ciò è stato osservato nella polmonite causata da batteri e nelle infezioni cutanee batteriche correlate alla varicella. Se prende questo medicinale mentre ha un'infezione e i sintomi dell'infezione persistono o peggiorano, si rivolga immediatamente al medico.

I farmaci antiinfiammatori/antidolorifici come ibuprofene possono essere associati a un modesto aumento del rischio di attacco cardiaco o ictus, specialmente se somministrati in dosi elevate. Non superare la dose raccomandata o la durata del trattamento.

Deve discutere la terapia con il medico o farmacista prima di prendere IBUPROFENE ALTER:

- se avverte un qualsiasi **sintomo insolito all'addome**, in particolare se questi sintomi si presentano all'inizio del trattamento. Infatti il rischio di **sanguinamento** o **ulcerazione** del tratto digestivo è maggiore in questo caso, in particolare se è anziano, se assume dosi elevate di questo medicinale e se assume altri medicinali (vedere paragrafo “Altri medicinali ed IBUPROFENE ALTER”). Se si presentano sanguinamento o ulcerazione del tratto digestivo, il trattamento deve essere interrotto perché possono essere mortali. Deve prestare particolare attenzione se ha avuto un'ulcera gastrica o intestinale, in particolare se è stata complicata da perforazione o accompagnata da sanguinamento

- se ha problemi cardiaci inclusi attacco cardiaco, angina (dolore al petto) o se ha precedenti di attacco cardiaco, intervento di bypass coronarico, malattia arteriosa periferica (scarsa circolazione alle gambe o ai piedi dovuta a restringimento oppure ostruzione delle arterie) oppure qualunque tipo di ictus (incluso “mini-ictus” o “TIA”, attacco ischemico transitorio)
- se ha pressione alta, diabete, colesterolo alto, storia familiare di malattia cardiaca o ictus, oppure se è un fumatore
- se manifesta gonfiore alle gambe (edema), problemi al cuore (insufficienza cardiaca) o pressione del sangue elevata che possono essere i sintomi di **problemi ai reni**. Faccia attenzione se si trova in una condizione di disidratazione considerevole. IBUPROFENE ALTER può infatti causare problemi ai reni soprattutto in persone anziane o che hanno già problemi ai reni, al cuore, al fegato o che assumono diuretici o ACE inibitori. Interrompa il trattamento se si verificano problemi ai reni. Negli adolescenti questi problemi si possono manifestare più facilmente se presentano un basso livello di liquidi (disidratazione).

Questo medicinale **può causare**:

- problemi al cervello (meningite asettica) in rare occasioni. Questo si può verificare soprattutto in persone che soffrono di malattie come lupus eritematoso sistemico e malattie del tessuto connettivo collegate
- danni permanenti ai reni, con rischio di insufficienza renale. Questo le può accadere se assume abitualmente questo medicinale
- problemi agli occhi. Se assume questo medicinale per periodi prolungati, si sottoponga a controlli periodici.

Reazioni cutanee

Sono state segnalate reazioni cutanee gravi in associazione al trattamento con IBUPROFENE ALTER. Interrompa l'assunzione di IBUPROFENE ALTER e consulti immediatamente il medico se si manifestano eruzione cutanea, lesioni delle mucose, vescicole o altri segni di allergia, in quanto possono essere i primi segni di una reazione cutanea molto grave. Vedere paragrafo 4.

IBUPROFENE ALTER può nascondere i sintomi o i segni di un'infezione (febbre, dolore e gonfiore) e prolungare temporaneamente il tempo di sanguinamento.

Bambini

Questo medicinale non deve essere usato nei bambini di età inferiore ai 12 anni di età.

Anziani

Se è anziano può essere maggiormente soggetto ad effetti indesiderati, in particolare al sanguinamento e alla perforazione del tratto digestivo, che può essere letale.

Altri medicinali e IBUPROFENE ALTER

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale, compresi quelli senza prescrizione medica.

Gli effetti indesiderati di IBUPROFENE ALTER possono essere aumentati se viene assunto contemporaneamente a determinati medicinali. IBUPROFENE ALTER può influenzare o essere influenzato da altri medicinali. Ad esempio:

Informi il medico o il farmacista se sta prendendo uno dei seguenti medicinali:

- Inibitori della Cox-2 e altri **FANS** (ad esempio acetilsalicilico), medicinali usati per l'infiammazione;
- **medicinali che hanno un effetto anticoagulante** (vale a dire sostanze che fluidificano il sangue impedendo la formazione dei coaguli, es. aspirina/acido acetilsalicilico, warfarin, ticlopidina);

- **inibitori dell'aggregazione piastrinica** (usati contro la formazione dei coaguli) **metotrexato** (impiegato nel trattamento del cancro e delle malattie autoimmuni);
- **fenitoina** (usata nella prevenzione delle convulsioni epilettiche);
- **litio** (usato per trattare la depressione e la mania);
- **diuretici**, inclusi i diuretici risparmiatori di potassio;
- **medicinali che riducono la pressione alta** (ACE-inibitori, ad es. captopril, betabloccanti come atenololo, antagonisti dei recettori dell'angiotensina II come losartan);
- **colestiramina** (impiegata nel trattamento del colesterolo alto);
- **aminoglicosidi** (medicinali contro alcuni tipi di batteri);
- **SSRI** (medicinali contro la depressione);
- **moclobemide** (un medicinale usato per il trattamento della malattia depressiva o della fobia sociale);
- **ciclosporina, tacrolimus** (usato per l'immunosoppressione dopo trapianto di organo);
- **zidovudina e ritonavir** (impiegati per il trattamento dei pazienti HIV positivi);
- **mifepristone** (utilizzato per l'aborto chimico);
- **probenecid o sulfinpirazone** (usati per il trattamento della gotta);
- **antibiotici chinolonici**;
- **sulfaniluree** (usate per il trattamento del diabete di tipo 2);
- **corticosteroidi** (usati contro le infiammazioni);
- **estratti a base di Ginkgo Biloba**, utilizzato per trattare alcuni problemi di circolazione, può aumentare il rischio di sanguinamento in associazione a FANS;
- **bifosfonati** (impiegati nell'osteoporosi, nella malattia di Paget e per ridurre i livelli elevati di calcio nel sangue);
- **oxpentifillina** [(pentoxifillina) impiegata nel trattamento della malattia circolatoria delle arterie delle gambe o delle braccia];
- **baclofene** (un rilassante muscolare);
- **inibitori del CYP2C9** (come voriconazolo e fluconazolo) usati nel trattamento di infezioni fungine.

Anche alcuni altri medicinali possono influenzare o essere influenzati dal trattamento con IBUPROFENE ALTER. Chieda sempre il consiglio del medico o del farmacista prima di usare IBUPROFENE ALTER con altri medicinali.

Se durante il trattamento con IBUPROFENE ALTER deve assumere altri medicinali è necessario bere una adatta quantità di liquidi ed eseguire dei controlli periodici ai reni.

IBUPROFENE ALTER con alcol

Eviti di bere alcolici perché possono aumentare gli effetti indesiderati di IBUPROFENE ALTER, in particolare quelli a carico dello stomaco, dell'intestino o del cervello.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Gravidanza

Non assuma IBUPROFENE ALTER durante gli ultimi tre mesi di gravidanza perché può causare importanti disturbi al cuore, ai polmoni e ai reni del feto. Se impiegato al termine della gravidanza, può causare tendenze al sanguinamento sia nella madre che nel feto e indebolire la forza delle contrazioni uterine, ritardando così l'insorgenza del parto. Nei primi 6 mesi di gravidanza il medico potrà prescrivere questo medicinale solo se strettamente necessario.

Allattamento

Eviti di assumere IBUPROFENE ALTER perché compare nel latte materno in quantità molto piccole e non è generalmente necessario interrompere l'allattamento durante i trattamenti di breve durata. Se, tuttavia, viene prescritto un trattamento prolungato, il medico deve valutare la possibilità di uno svezzamento precoce.

Fertilità

IBUPROFENE ALTER può diminuire la probabilità di entrare in stato di gravidanza. Informi il medico se sta pianificando una gravidanza o ha problemi di fertilità.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

IBUPROFENE ALTER potrebbe influire sulla capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari. Se si manifestano effetti come affaticamento, sonnolenza, vertigini (segnalati come comuni) e disturbi della vista (segnalati come non comune), i quali possono aumentare se assume alcol durante il trattamento con IBUPROFENE ALTER, eviti di guidare e di usare macchinari.

3. Come prendere IBUPROFENE ALTER

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Gli effetti indesiderati possono essere ridotti al minimo impiegando la dose efficace più bassa, per il più breve periodo di tempo necessario a controllare i sintomi.

Deglutisca la compressa intera con dell'acqua.

Deve essere usata la dose efficace più bassa per il periodo più breve necessario ad alleviare i sintomi.

Se ha un'infezione, si rivolga immediatamente al medico qualora i sintomi (per esempio febbre e dolore) persistano o peggiorino (vedere paragrafo 2).

La dose raccomandata è:

Adulti e adolescenti oltre i 12 anni

IBUPROFENE ALTER 400 mg

La dose raccomandata è di 2-4 compresse al giorno, secondo prescrizione medica.

IBUPROFENE ALTER 600 mg

La dose raccomandata è di 1-3 compresse al giorno, secondo prescrizione medica.

Non superi la dose massima giornaliera 1800 mg.

Se sta assumendo questo medicinale per il trattamento dei dolori reumatici, assuma la prima dose al mattino, quando si sveglia, e le dosi successive ai pasti.

Anziani e pazienti con problemi al fegato o ai reni

Il medico le indicherà la dose necessaria in questi casi.

Se prende più IBUPROFENE ALTER di quanto deve

Se ha preso più IBUPROFENE ALTER di quanto deve o se il suo bambino ha assunto questo medicinale per errore, contatti sempre un medico o l'ospedale più vicino allo scopo di ricevere un parere sul rischio e consigli in merito alle azioni da intraprendere.

I sintomi possono comprendere nausea, mal di stomaco, vomito (con eventuale presenza di tracce di sangue), mal di testa, ronzio nelle orecchie, confusione e movimenti incontrollati degli occhi. A dosaggi elevati, sono stati segnalati sonnolenza anche marcata (letargia), dolore al petto, palpitazioni, perdita di coscienza, convulsioni (soprattutto nei bambini), debolezza e vertigini, sangue nelle urine, sensazione di freddo al corpo e problemi respiratori. I sintomi di sovradosaggio generalmente si manifestano entro 4-6 ore .

Raramente sono stati anche riportati movimenti incontrollati e ritmici degli occhi (nistagmo), aumento dell'acidità del sangue (acidosi metabolica), abbassamento della temperatura del corpo (ipotermia), problemi ai reni, aumento della tendenza al sanguinamento a stomaco e intestino, coma, respirazione ridotta (apnea), diarrea e diminuzione dell'attività del sistema nervoso centrale e della respirazione.

Sono stati riportati disorientamento, stato di eccitazione, svenimento, pressione del sangue bassa, diminuzione o aumento dei battiti del cuore (bradicardia o tachicardia). Nei casi di sovradosaggio significativo sono possibili insufficienza renale e danno al fegato.

In caso di ingestione/assunzione di una dose eccessiva di questo medicinale consulti immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di prendere IBUPROFENE ALTER

Se dimentica di prendere una dose, non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Gli effetti indesiderati sono più probabili con dosi più elevate e maggiore durata del trattamento.

Interrompa il trattamento con IBUPROFENE ALTER e si rivolga immediatamente al medico se si manifestano i seguenti effetti indesiderati:

È possibile che si verifichi una reazione cutanea grave nota come sindrome DRESS. I sintomi della DRESS comprendono: eruzione cutanea, febbre, gonfiore dei linfonodi e aumento degli eosinofili (un tipo di globuli bianchi).

Comune (possono interessare fino a 1 su 10 persone):

- capogiro, affaticamento, malessere

Non comune (possono interessare fino a 1 su 100 persone):

- problemi alla vista, ipersensibilità alla luce, reazioni dovute a ipersensibilità, quali eruzioni cutanee (rash, orticaria, esantema), prurito, attacchi d'asma (a volte accompagnati da bassa pressione sanguigna), grave irritazione della pelle associata a sanguinamento (porpora)
- sonnolenza, insonnia e ansia
- gastrite

- problemi ai reni, infiammazione dei reni e insufficienza renale
- secrezione abbondante dalle vie nasali (rinite)
- difficoltà respiratoria (broncospasmo, apnea, dispnea), gonfiore del volto, della lingua o della gola (laringe), che può causare grande difficoltà di respirazione (angioedema)
- trillo o ronzio nelle orecchie, disturbi dell'udito, vertigine
- problemi al fegato (ittero), infiammazione del fegato (epatite), alterata funzionalità del fegato
- parestesia.

Raro (possono interessare fino a 1 su 1.000 persone):

- depressione, stato confusionale, allucinazioni
- lupus eritematoso sistemico
- riduzione del numero dei globuli bianchi (leucopenia, neutropenia, agranulocitosi)
- riduzione dei livelli delle piastrine (trombocitopenia)
- riduzione dei livelli dei globuli rossi (anemia emolitica)
- riduzione dei livelli di tutti i componenti del sangue (anemia aplastica)
- disturbi dei nervi degli occhi (neurite ottica, neuropatia ottica tossica), disturbi della vista
- gonfiore dovuto ad accumulo di liquidi
- infezione delle membrane che avvolgono il cervello (meningite asettica).

Molto raro (possono interessare fino a 1 su 10.000 persone):

- grave reazione di ipersensibilità con gonfiore del volto, della lingua e della gola, affanno, respirazione asmatica, accelerazione del battito cardiaco, grave calo della pressione sanguigna o shock potenzialmente letale (anafilassi)
- gonfiore dovuto ad accumulo di liquidi (edema, edema polmonare acuto)
- grave eruzione cutanea con vesciche sulla pelle, in particolare su gambe, braccia, mani e piedi, che possono estendersi al volto e alle labbra (dermatite esfoliativa e dermatite bollosa che comprendono sindrome di Stevens-Johnson), necrolisi epidermica tossica (una grave infezione della pelle con distruzione della cute) ed eritema multiforme (grave irritazione della pelle)
- fastidiosa consapevolezza del battito cardiaco (palpitazioni), insufficienza cardiaca, attacco cardiaco o elevata pressione sanguigna, infarto del miocardio
- disturbi della formazione dei globuli rossi (con sintomi quali: febbre, mal di gola, ulcere alla superficie della bocca, sintomi simil-influenzali, grave affaticamento, sanguinamento nasale e della pelle)
- infiammazione del pancreas (pancreatite)
- insufficienza epatica.

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

- bruciori gastrici, dolore addominale, indigestione
- disturbi del tratto digestivo, quali diarrea, nausea, vomito, flatulenza, stitichezza
- feci nere o presenza di sangue nelle feci (melena) o nel vomito (ematemesi, ulcera del tratto digestivo con sanguinamento)
- ulcera del tratto digestivo con o senza perforazione, anche mortale (ulcera peptica, emorragia gastrointestinale), specialmente nelle persone anziane
- sensazione di bruciore allo stomaco (gastrite, pirosi gastrica), infiammazione della mucosa orale associata a formazione di lesioni (stomatiti ulcerative)
- infiammazione intestinale e peggioramento dell'infiammazione del colon (colite) e del tratto digestivo (morbo di Crohn)
- reazione allergica anche grave (reazione allergica non specifica, anafilassi)
- un'eruzione cutanea diffusa, rossa e squamosa, con formazione di pustole sotto la pelle e vescicole localizzate principalmente sulle pieghe cutanee, sul tronco e sugli arti superiori accompagnate da febbre all'inizio del trattamento (pustolosi esantematica acuta generalizzata). Smetta di usare IBUPROFENE ALTER se sviluppa questi sintomi e contatti immediatamente il medico. Vedere anche il paragrafo 2.
- la cute diventa sensibile alla luce

I medicinali come IBUPROFENE ALTER possono essere associati a un rischio leggermente superiore di attacco cardiaco (infarto del miocardio) o ictus. In associazione ai FANS sono stati segnalati gonfiore dovuto ad accumulo di liquidi (edema), elevata pressione del sangue e problemi al cuore (insufficienza cardiaca).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare IBUPROFENE ALTER

Conservi il medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scad." La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene IBUPROFENE ALTER

IBUPROFENE ALTER 400 mg Compresse rivestite con film

- Il principio attivo è ibuprofene. Ogni compressa rivestita con film contiene 400 mg di ibuprofene.
- Gli altri componenti sono: cellulosa microcristallina, amido di mais, sodio amidoglicolato (tipo A), magnesio stearato, talco, silice colloidale anidra, povidone, ipromellosa, titanio diossido, glicerolo triacetato.

IBUPROFENE ALTER 600 mg Compresse rivestite con film

- Il principio attivo è ibuprofene. Ogni compressa rivestita con film contiene 600 mg di ibuprofene.
- Gli altri componenti sono: cellulosa microcristallina, amido di mais, sodio amidoglicolato (tipo A), magnesio stearato, talco, silice colloidale anidra, povidone, ipromellosa, titanio diossido, glicerolo triacetato.

Descrizione dell'aspetto di IBUPROFENE ALTER e contenuto della confezione

Confezione da 30 compresse da 400 mg.

Confezione da 30 compresse da 600 mg.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Laboratori Alter S.r.l., Via Egadi, 7 - 20144 Milano

Produttore

Laboratorios Alter S.A., C/ Mateo Inurria, 30 - 28036 Madrid, Spagna

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:

Marzo 2022