

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore
Loratadina Teva 10 mg compresse
loratadina

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le hanno detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è Loratadina Teva e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Loratadina Teva
3. Come prendere Loratadina Teva
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Loratadina Teva
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Loratadina Teva e a cosa serve

Il nome completo di questo medicinale è Loratadina Teva 10 mg compresse.

Cos'è Loratadina Teva

Loratadina Teva contiene il principio attivo loratadina che appartiene a una classe di medicinali chiamati "antistaminici".

Come funziona Loratadina Teva

Loratadina Teva aiuta a ridurre i sintomi allergici, contrastando gli effetti di una sostanza chiamata "istamina", che viene prodotta dal corpo umano quando si è allergici a qualcosa.

Quando deve essere assunta Loratadina Teva

Loratadina Teva allevia i sintomi associati alla rinite allergica (ad esempio raffreddore da fieno), quali starnuti, naso che cola e prurito nasale, e bruciore o prurito agli occhi negli adulti e bambini di età pari o superiore a 6 anni che pesano più di 30 kg.

Loratadina Teva viene utilizzato anche per alleviare i sintomi associati all'orticaria (prurito, arrossamento e numero e grandezza dei pomfi).

L'effetto di Loratadina Teva dura un giorno intero e aiuta a riprendere le normali attività giornaliere e il sonno.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Loratadina Teva

Non prenda Loratadina Teva

- se è allergico alla loratadina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista o all'infermiere prima di prendere Loratadina Teva se:

- soffre di disturbi al fegato
- ha programmato di fare dei test cutanei per le allergie. Non deve assumere Loratadina Teva nei due giorni precedenti i test. Questo perché può influenzare i risultati dei test.

Se compare uno qualsiasi dei problemi sopra riportati (o se non è sicuro), si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere prima di prendere Loratadina Teva.

Bambini

Non somministrare Loratadina Teva ai bambini di età inferiore a 6 anni o ai bambini che pesano 30 kg o meno. Ci sono altre formulazioni più adatte per i bambini di età inferiore a 6 anni o con peso corporeo uguale o inferiore a 30 kg.

Bambini sotto i due anni di età:

La sicurezza e l'efficacia di Loratadina Teva non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili.

Altri medicinali e Loratadina Teva

Gli effetti indesiderati di Loratadina Teva possono aumentare quando viene assunto insieme a medicinali che alterano la funzionalità di alcuni enzimi responsabili del metabolismo del farmaco nel fegato. Tuttavia, negli studi clinici, non è stato osservato alcun aumento degli effetti indesiderati della loratadina con prodotti che alterano il funzionamento di questi enzimi.

Informi il medico, il farmacista o l'infermiere se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale. Questo comprende anche i medicinali senza prescrizione medica.

Loratadina Teva e alcol

Loratadina Teva non ha mostrato di potenziare gli effetti delle bevande alcoliche.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Come misura precauzionale, è preferibile evitare l'uso di Loratadina Teva durante la gravidanza. Non prenda Loratadina Teva se sta allattando. La loratadina viene escreta nel latte materno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

In studi clinici effettuati per valutare la capacità di guidare veicoli, non sono stati osservati effetti negativi in pazienti trattati con loratadina. Alla dose raccomandata, non è previsto che Loratadina Teva le causi sonnolenza o riduzione del grado di attenzione. Tuttavia, la sonnolenza si è manifestata molto raramente in alcune persone, cosa che può influenzare la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

Loratadina Teva contiene lattosio.

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

3. Come prendere Loratadina Teva

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio illustrativo o le istruzioni del medico, del farmacista o dell'infermiere. Se ha dubbi consulti il medico, il farmacista o l'infermiere.

La linea di incisione serve solo per agevolare la rottura della compressa nel caso abbia difficoltà a deglutirla intera.

La dose raccomandata è:

Adulti e bambini di età pari o superiore a 6 anni con peso corporeo superiore a 30 kg:

Assumere una compressa una volta al giorno con un bicchiere d'acqua, con o senza cibo.

Peso corporeo uguale o inferiore a 30 kg:

Non somministrare Loratadina Teva. Esistono altre formulazioni più indicate per i bambini di età inferiore a 6 anni o con peso uguale o inferiore a 30 kg.

Bambini di età inferiore a 2 anni:

Loratadina Teva non è raccomandato nei bambini di età inferiore a 2 anni.

Adulti e bambini con gravi problemi epatici:

Adulti e bambini che pesano più di 30 kg

Assumere una compressa a giorni alterni con un bicchiere d'acqua, con o senza cibo. Tuttavia, prima di prendere questo medicinale, deve parlare con il medico, il farmacista o l'infermiere.

Se prende più Loratadina Teva di quanto deve

Se prende più Loratadina Teva di quanto deve, contatti immediatamente il medico o il farmacista. Non sono attesi problemi gravi ma, si può avere cefalea, battito cardiaco accelerato o sonnolenza.

Se dimentica di prendere Loratadina Teva

- Se dimentica di prendere la dose, la prenda il più presto possibile; successivamente continui a prendere il medicinale come al solito.
- Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Smetta di prendere Loratadina Teva e contatti immediatamente il medico se nota i seguenti sintomi:

- reazione allergica: gonfiore del viso, delle labbra, della lingua o della gola, difficoltà della respirazione dovuta al restringimento delle vie aeree, shock, collasso, eruzione cutanea, prurito,
- battito cardiaco accelerato o irregolare,
- modificazione della funzionalità epatica (questo può risultare da un esame del sangue).

Altri effetti indesiderati:

Molto comune negli adulti e nei bambini di età superiore a 12 anni (può interessare più di 1 persona su 10):

- sonnolenza,
- cefalea,
- aumento dell'appetito,
- difficoltà a dormire.

Molto comune nei bambini dai 2 ai 12 anni (può interessare più di 1 persona su 10):

- cefalea,
- nervosismo,
- affaticamento.

Molto raro (può interessare 1 persona su 10.000); sono stati segnalati durante la commercializzazione di loratadina:

- capogiro,
- convulsione,
- nausea (sensazione di malessere),
- secchezza della bocca,

- mal di stomaco,
- perdita di capelli,
- eruzione cutanea,
- stanchezza.

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base di dati disponibili):

- aumento di peso.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Loratadina Teva

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non metta le compresse in un altro contenitore.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sul blister dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non usi questo medicinale se nota qualsiasi cambiamento dell'aspetto della compressa.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Questo medicinale non richiede particolari condizioni di conservazione.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Loratadina Teva

- Il principio attivo è loratadina. Ogni compressa contiene 10 mg di loratadina.
- Gli altri componenti sono lattosio monoidrato, amido di mais, amido pregelatinizzato e magnesio stearato. Contiene lattosio (vedere paragrafo 2 "Loratadina Teva contiene lattosio").

Descrizione dell'aspetto di Loratadina Teva e contenuto della confezione

Loratadina Teva 10 mg compresse sono compresse bianche, ovali, scanalate su un lato e lisce sull'altro, con "L" e "10" impressi su entrambi i lati delimitati dalla linea di incisione.

Il medicinale è disponibile nelle confezioni contenenti 5, 7, 10, 15, 20, 28, 30, 50 o 100 compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Teva Italia S.r.l. – Piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano

Produttore

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company – Pallagi út 13 – 4042 Debrecen (Ungheria)
Pharmachemie B.V. – Swensweg, 5 – PO Box 552 - 2003 RN Haarlem (Paesi Bassi)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il Novembre 2022