

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Topiramato Sandoz 25 mg compresse rivestite con film
Topiramato Sandoz 50 mg compresse rivestite con film
Topiramato Sandoz 100 mg compresse rivestite con film
Topiramato Sandoz 200 mg compresse rivestite con film

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista (vedere paragrafo 4).

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è Topiramato Sandoz e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Topiramato Sandoz
3. Come prendere Topiramato Sandoz
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Topiramato Sandoz
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Topiramato Sandoz e a cosa serve

Topiramato Sandoz appartiene a un gruppo di medicinali chiamati “farmaci antiepilettici”. È usato:

- da solo per il trattamento delle crisi epilettiche negli adulti e nei bambini di età superiore ai 6 anni
- con altri medicinali per il trattamento delle crisi epilettiche negli adulti e nei bambini di 2 anni e superiori
- per prevenire l'emicrania negli adulti.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Topiramato Sandoz

Non prenda Topiramato Sandoz

- se è allergico a topiramato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati nel paragrafo 6)
- per la prevenzione dell'emicrania: se è in gravidanza o se è una donna in età fertile a meno che non stia utilizzando un adeguato metodo contraccettivo (vedere il paragrafo “Gravidanza e allattamento” per ulteriori informazioni). Deve parlare con il medico in merito al tipo di contraccezione migliore da usare durante l'assunzione di Topiramato Sandoz.

Se non è sicuro che le condizioni sopra citate siano pertinenti al suo caso, consulti il medico o il farmacista prima di utilizzare Topiramato Sandoz.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Topiramato Sandoz se:

- soffre di disturbi renali, in particolare calcoli, o se è sottoposto a dialisi renale
- presenta un'anamnesi di anomalie del sangue e dei liquidi organici (acidosi metabolica)

- soffre di disturbi al fegato
- soffre di disturbi agli occhi, in particolare glaucoma
- soffre di un disturbo della crescita
- segue una dieta ricca di grassi (dieta chetogenica)
- sta assumendo Topiramato Sandoz per trattare l'epilessia ed è in gravidanza o è una donna in età fertile (vedere paragrafo "Gravidanza e allattamento" per ulteriori informazioni)

Se non è sicuro che una delle condizioni sopra citate sia pertinente al suo caso, consulti il medico o il farmacista prima di usare Topiramato Sandoz.

È importante che non interrompa l'assunzione del medicinale senza prima aver consultato il medico.

Deve inoltre parlare con il medico prima di assumere qualsiasi medicinale a base di topiramato che le venga somministrato in alternativa a Topiramato Sandoz.

Con l'utilizzo di Topiramato Sandoz può perdere peso, pertanto mentre assume questo medicinale il suo peso deve essere controllato regolarmente. Se perde troppo peso o se un bambino che sta usando questo medicinale non cresce abbastanza di peso, consulti il medico.

Un numero esiguo di persone trattate con antiepilettici come Topiramato Sandoz ha manifestato pensieri autolesionisti o suicidi. Nel caso in cui, in qualsiasi momento, nutra questo tipo di pensieri, contatti immediatamente il medico.

Topiramato Sandoz può causare reazioni cutanee gravi, informi il suo medico immediatamente se sviluppa un'eruzione cutanea e/o vesciche (vedere anche la sezione 4 "Possibili effetti indesiderati").

Topiramato Sandoz può in rari casi causare elevati livelli di ammoniaca nel sangue (vedere negli esami del sangue) che possono portare ad un cambiamento nella funzione del cervello, soprattutto se si sta prendendo un medicinale chiamato acido valproico o sodio valproato. Dal momento che questa può essere una condizione grave, informi immediatamente il medico se si verificano i seguenti sintomi (vedere anche paragrafo 4 "Possibili effetti indesiderati"):

- difficoltà a pensare, a ricordare le informazioni o a risolvere i problemi
- essere meno vigile o consapevole
- sentirsi molto assonnato e con poca energia

A dosi più elevate di Topiramato Sandoz, il rischio di sviluppare questi sintomi può aumentare.

Altri medicinali e Topiramato Sandoz

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale. Topiramato Sandoz e alcuni altri medicinali possono influenzare i reciproci effetti. A volte il dosaggio di alcuni degli altri medicinali che sta assumendo o quello di Topiramato Sandoz dovrà essere aggiustato.

In particolare, informi il medico o il farmacista se sta prendendo:

- altri medicinali che compromettono o riducono il pensiero, la concentrazione o la coordinazione muscolare (per esempio i medicinali depressivi del sistema nervoso centrale, come i rilassanti muscolari e i sedativi)
- la pillola anticoncezionale. Topiramato Sandoz può ridurre l'efficacia della pillola anticoncezionale. Deve parlare con il medico in merito al tipo di contraccezione migliore da utilizzare durante l'assunzione di Topiramato Sandoz.

Informi il medico se nota un cambiamento nel suo sanguinamento mestruale mentre sta assumendo la pillola anticoncezionale e Topiramato Sandoz.

Tenga un elenco di tutti i medicinali che assume. Mostri questo elenco al medico o al farmacista prima di iniziare a prendere un nuovo medicinale.

Gli altri medicinali di cui deve discutere con il medico o con il farmacista comprendono altri medicinali antiepilettici, risperidone, litio, idroclorotiazide, metformina, pioglitazone, glibenclamide, amitriptilina, propranololo, diltiazem, venlafaxina, flunarizina, erba di S. Giovanni (*Hypericum perforatum*) (una preparazione a base di erbe usata per trattare la depressione), warfarin usato per fluidificare il sangue.

Se non è sicuro che una delle condizioni sopra citate sia pertinente al suo caso, consulti il medico o il farmacista prima di usare Topiramato Sandoz.

Topiramato Sandoz con cibi, bevande e alcol

Può assumere Topiramato Sandoz con o senza cibo. In corso di trattamento con Topiramato Sandoz beva molti liquidi durante il giorno, al fine di prevenire la formazione di calcoli renali. Durante il trattamento con Topiramato Sandoz deve evitare di consumare alcol.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Prevenzione dell'emicrania:

Topiramato Sandoz può nuocere al feto. Non deve utilizzare Topiramato Sandoz se è in gravidanza. Non deve usare Topiramato Sandoz per la prevenzione dell'emicrania se è una donna in età fertile a meno che non stia usando una contraccezione efficace. Chieda al proprio medico in merito al tipo di contraccezione migliore e se Topiramato Sandoz è adatto a lei.

Prima dell'inizio del trattamento con Topiramato Sandoz deve essere eseguito un test di gravidanza.

Trattamento dell'epilessia:

Se è una donna in età fertile, deve parlare con il medico di altri possibili trattamenti al posto di Topiramato Sandoz. Se si decide di usare Topiramato Sandoz, deve usare una contraccezione efficace. Si rivolga al medico in merito al tipo di contraccezione migliore da usare durante l'assunzione di Topiramato Sandoz. Prima dell'inizio del trattamento con Topiramato Sandoz, deve essere eseguito un test di gravidanza.

Si rivolga al medico se desidera una gravidanza.

Come per altri medicinali antiepilettici, esiste il rischio di un danno al feto se Topiramato Sandoz viene usato in gravidanza. Si assicuri di avere ben compreso i rischi e i benefici dell'utilizzo di Topiramato Sandoz per l'epilessia durante la gravidanza.

- Se prende Topiramato Sandoz durante la gravidanza, il suo bambino ha un rischio maggiore di difetti alla nascita, in particolare, il labbro leporino (fessura nel labbro superiore) e la palatoschisi (fessura del palato). I neonati maschi possono anche avere una malformazione del pene (ipospadia). Questi difetti possono svilupparsi all'inizio della gravidanza, anche prima di sapere di essere in gravidanza.
- Se prende Topiramato Sandoz durante la gravidanza, il suo bambino potrebbe essere più piccolo di quanto previsto alla nascita. Si rivolga al medico se ha domande su questo rischio durante la gravidanza.
- Possono esserci altri medicinali per trattare la sua condizione che hanno un rischio minore di difetti alla nascita.
- Informi immediatamente il medico se subentra una gravidanza durante l'assunzione di Topiramato Sandoz. Lei e il medico dovete decidere se continuare a prendere Topiramato Sandoz durante la gravidanza.

Allattamento

La sostanza attiva in Topiramato Sandoz (topiramato) passa nel latte materno. Effetti sono stati osservati nei neonati allattati da madri trattate, tra cui diarrea, sensazione di sonnolenza, sensazione di irritabilità e scarso aumento di peso. Pertanto, il medico discuterà con lei se rinunciare all'allattamento al seno o se rinunciare al trattamento con Topiramato Sandoz. Il medico prenderà in considerazione l'importanza del medicinale per la madre e il rischio per il bambino.

Quando assumono Topiramato Sandoz, le madri che allattano al seno devono informare il medico il prima possibile, qualora il bambino manifesti qualsiasi reazione insolita.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Durante il trattamento con Topiramato Sandoz possono insorgere capogiri, stanchezza e disturbi della vista. Non guidi né usi attrezzi o macchinari senza prima aver consultato il medico.

Topiramato Sandoz contiene lattosio e sodio.

Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol di sodio (23 mg) per compressa rivestita, cioè essenzialmente “senza sodio”.

3. Come prendere Topiramato Sandoz

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi, consulti il medico o il farmacista.

- In genere il medico le prescriverà di iniziare con una dose bassa di Topiramato Sandoz, per poi aumentarla lentamente fino ad individuare il dosaggio più adatto al suo caso.
- Le compresse di Topiramato Sandoz devono essere inghiottite intere. Eviti di masticare le compresse, poiché possono lasciare un sapore amaro.
- Topiramato Sandoz può essere assunto prima, durante o dopo un pasto. In corso di trattamento con Topiramato Sandoz beva molti liquidi durante il giorno per evitare la formazione di calcoli renali.

Se prende più Topiramato Sandoz di quanto deve

- Consulti immediatamente un medico. Porti con sé la confezione del medicinale.
- Potrebbe sentirsi assonnato, stanco o avere poca attenzione; mancanza di coordinazione; avere difficoltà di linguaggio o concentrazione; avere visione doppia o offuscata; avere capogiri causati dalla bassa pressione arteriosa; sentirsi depressi o agitati; o dolore addominale, o convulsioni (attacchi).

Se sta assumendo altri medicinali insieme a Topiramato Sandoz può verificarsi un sovradosaggio.

Se dimentica di prendere Topiramato Sandoz

- Se dimentica di prendere una dose, la assuma non appena se ne ricorda. Tuttavia, se è quasi l'ora della dose successiva, ometta la dose dimenticata e continui come al solito. Se dimentica due o più dosi, contatti il medico.
- Non prenda una dose doppia (due dosi allo stesso tempo) per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Topiramato Sandoz

Non smetta di prendere questo medicinale, se non su indicazione del medico. I suoi sintomi possono ripresentarsi. Se il medico decide di interrompere questo medicinale, potrebbe diminuirne gradualmente il dosaggio nell'arco di alcuni giorni.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Informi il medico o si rivolga immediatamente all'ospedale se manifesta i seguenti effetti indesiderati:

Molto comune (può interessare più di 1 persona su 10)

- Depressione (nuova manifestazione o peggioramento)

Comune (può interessare fino a 1 persona su 10)

- Convulsioni (attacchi)
- Ansia, irritabilità, cambiamenti di umore, confusione, disorientamento
- Problemi con la concentrazione, pensiero rallentato, perdita di memoria, problemi con la memoria (nuova manifestazione, cambiamento improvviso o aumento della gravità)
- Calcoli al rene, frequente necessità di urinare o dolore quando si urina

Non comune (può interessare fino a 1 persona su 100)

- Aumento del livello di acido nel sangue (può causare difficoltà respiratoria compresa mancanza di respiro, perdita di appetito, nausea, vomito, stanchezza eccessiva e battiti cardiaci veloci o irregolari)
- Diminuzione della sudorazione o assenza della sudorazione (specialmente nei bambini che sono esposti alle alte temperature)
- Avere pensieri di grave autolesionismo, cercare di farsi del male gravemente
- Perdita di parte del campo visivo

Raro (può interessare fino a 1 persona su 1.000)

- Glaucoma, che consiste in una ritenzione di liquido nell'occhio che determina un'aumentata pressione oculare, dolore e diminuzione della vista
- Difficoltà a pensare, ricordare informazioni o risolvere problemi, essere meno vigili o consapevoli, sentirsi molto assonnato con poca energia, questi sintomi possono essere un segno di un alto livello di ammoniaca nel sangue (iperammoniemia), che può portare ad un cambiamento della funzione cerebrale (encefalopatia iperammoniemica).
- Reazioni cutanee gravi, come la sindrome di Stevens-Johnson e la necrolisi epidermica tossica - queste possono apparire come eruzioni cutanee con o senza vesciche. Irritazione della pelle, piaghe o gonfiore in bocca, gola, naso, occhi e intorno ai genitali. Le eruzioni cutanee possono svilupparsi in gravi e diffusi danni alla pelle (desquamazione dell'epidermide e delle mucose superficiali) con conseguenze pericolose per la vita.

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

- infiammazione dell'occhio (uveite) con sintomi quali arrossamento dell'occhio, dolore, sensibilità alla luce, lacrimazione, vista offuscata o disturbata dalla comparsa di piccoli puntini davanti agli occhi.

Altri effetti indesiderati includono i seguenti, se peggiorano, si rivolga la medico o al farmacista:

Molto comune (può interessare più di 1 persona su 10)

- Naso chiuso, naso che cola o mal di gola
- Formicolio, dolore e/o intorpidimento di varie parti del corpo
- Sonnolenza, stanchezza
- Capogiri
- Nausea, diarrea
- Perdita di peso

Comune (può interessare fino a 1 persona su 10)

- Anemia (bassa conta dei globuli rossi)
- Reazione allergica (come eruzione cutanea, rossore, prurito, gonfiore del viso, orticaria)
- Diminuzione dell'appetito, perdita dell'appetito
- Aggressività, agitazione, ira, comportamento anomalo

- Difficoltà ad addormentarsi o a dormire
- Difficoltà a parlare o problemi nel linguaggio, linguaggio disarticolato
- Goffaggine o mancanza di coordinamento, sensazione di instabilità quando si cammina
- Diminuita capacità di completare le azioni routinarie
- Diminuzione, perdita o mancanza del senso del gusto
- Tremore involontario o agitazione; rapidi movimenti incontrollati degli occhi
- Disturbi della vista, come visione doppia, visione offuscata, diminuzione della vista, difficoltà di messa a fuoco
- Sensazione di capogiro (vertigini), ronzio alle orecchie, dolore all'orecchio
- Mancanza di respiro
- Tosse
- Sangue dal naso
- Febbre, malessere, debolezza
- Vomito, stipsi, dolore addominale o disagio, indigestione, stomaco o infezione intestinale
- Bocca secca
- Perdita di capelli
- Prurito
- Dolore o gonfiore, spasmi muscolari o spasmi, dolori muscolari o debolezza, dolore toracico
- Aumento di peso
- Deposito di calcio nei reni

Non comune (può interessare fino a 1 persona su 100)

- Diminuzione delle piastrine (cellule del sangue che aiutano a fermare l'emorragia), diminuzione dei globuli bianchi che aiutano a proteggere dalle infezioni, diminuzione del livello di potassio nel sangue
- Aumento degli enzimi epatici, aumento degli eosinofili (un tipo di globuli bianchi) nel sangue
- Gonfiore delle ghiandole del collo, delle ascelle o dell'inguine
- Aumento dell'appetito
- Umore elevato
- Sentire, vedere o percepire cose che non ci sono, gravi disturbi mentali (psicosi)
- Incapacità di mostrare e/o percepire emozioni, sospettosità ingiustificata, attacco di panico
- Problemi con la lettura, disturbi del linguaggio, problemi con la grafia
- Irrequietezza, iperattività
- Pensiero rallentato, diminuzione dello stato di veglia o vigilanza
- Movimenti del corpo ridotti o rallentati, movimenti muscolari involontari anomali o ripetitivi
- Svenimento
- Senso anormale del tatto, alterazioni del senso del tatto
- Compromissione, alterazione, o mancanza del senso dell'olfatto
- Sensazione insolita o sensazione che può precedere un attacco di emicrania o di un certo tipo di crisi
- Occhio secco, sensibilità degli occhi alla luce, spasmi delle palpebre, lacrimazione degli occhi
- Diminuzione o perdita dell'udito, perdita dell'udito in un orecchio
- Battito cardiaco lento o irregolare, percezione del battito cardiaco nel petto
- Bassa pressione sanguigna, bassa pressione sanguigna in posizione eretta (di conseguenza, alcune persone che assumono Topiramato Sandoz possono sentirsi deboli, accusare vertigini, o possono svenire quando si alzano o si siedono improvvisamente)
- Vampate, sensazione di calore
- Pancreatite (infiammazione del pancreas)
- Passaggio eccessivo di gas o di aria, bruciore di stomaco, sensazione di pienezza o gonfiore addominale
- Sanguinamento delle gengive, aumento della salivazione, bava alla bocca, alito cattivo
- Consumo eccessivo di liquidi, sete
- Alterazione del colore della pelle
- Rigidità muscolare, dolore al fianco
- Sangue nelle urine, incontinenza (mancanza di controllo) di urina, urgente bisogno di urinare, dolore al fianco o ai reni

- Difficoltà a raggiungere o mantenere l'erezione, disfunzione sessuale
- Sintomi simil-influenzali
- Dita delle mani e dei piedi fredde
- Sensazione di ubriachezza
- Difficoltà di apprendimento

Raro (può interessare fino a 1 persona su 1.000)

- Umore anormalmente elevato
- Perdita di coscienza
- Cecità in un occhio, cecità temporanea, cecità notturna
- Occhio pigro
- Gonfiore all'occhio e intorno agli occhi
- Intorpidimento, formicolio e cambiamento di colore (bianco, blu e poi rosso) nelle dita delle mani e dei piedi quando sono esposte al freddo
- Infiammazione del fegato, insufficienza epatica
- Odore della pelle anormale
- Sensazione di disagio in braccia o gambe
- Problema renale

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

- Maculopatia, una malattia della macula, la piccola porzione della retina nella quale la vista è più acuta. Se nota un cambiamento o una diminuzione della vista, contatti il medico

Bambini

Gli effetti indesiderati nei bambini sono generalmente simili a quelli osservati negli adulti. Tuttavia, i seguenti effetti indesiderati potrebbero essere più comuni nei bambini che negli adulti.

- Problemi di concentrazione
- Aumento dei livelli di acido nel sangue
- Avere pensieri di grave autolesionismo
- Stanchezza
- Diminuzione o aumento dell'appetito
- Aggressività, comportamento anormale
- Difficoltà ad addormentarsi o a rimanere addormentato
- Sensazione di instabilità quando si cammina
- Non sentirsi bene
- Diminuzione dei livelli di potassio nel sangue
- Non mostrare e/o non sentire emozioni
- Lacrimazione
- Battito cardiaco lento o irregolare

Altri effetti indesiderati che compaiono nei bambini sono:

Comune (può interessare fino a 1 persona su 10)

- Sensazione di giramento (vertigini)
- Vomito
- Febbre

Non comune (può interessare fino a 1 persona su 100)

- Aumento degli eosinofili (un tipo di globuli bianchi) nel sangue
- Iperattività
- Sentire caldo
- Difficoltà di apprendimento

Segnalazione di effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Topiramato Sandoz

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza, che è riportata sull'etichetta e sulla confezione esterna dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Blister:

Non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Flacone:

Non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Tenere il flacone ben chiuso per proteggere il medicinale dall'umidità.

Validità dopo prima apertura del flacone:

200 giorni.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Topiramato Sandoz

Il principio attivo è topiramato.

Ogni compressa rivestita con film contiene 25 mg di topiramato.

Ogni compressa rivestita con film contiene 50 mg di topiramato.

Ogni compressa rivestita con film contiene 100 mg di topiramato.

Ogni compressa rivestita con film contiene 200 mg di topiramato.

Gli altri componenti sono: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, amido, sodio amido glicolato, magnesio stearato, ipromellosa, titanio diossido (E 171), macrogol, polisorbato 80.

Inoltre, per 50 mg e 200 mg: ferro ossido giallo (E 172).

Descrizione dell'aspetto di Topiramato Sandoz e contenuto della confezione

25 mg e 100 mg:

Compressa rivestita con film, bianca, rotonda, liscia su entrambi i lati.

50 mg e 200 mg:

Compressa rivestita con film, gialla, rotonda, liscia su entrambi i lati.

Le compresse rivestite con film sono confezionate in blister in Al/Al o sono confezionate in un contenitore HDPE con tappo in PP, con gel di silicio come essicante, ed inserite in una scatola.

Confezioni:

Blister: 5, 6, 10, 20, 60 e 100 compresse rivestite con film.

Flacone: 20, 28, 50, 60, 100 e 200 compresse rivestite con film.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Sandoz Spa – Largo U. Boccioni, 1 – 21040 Origgio (VA), Italia

Produttori

LEK Pharmaceuticals d.d. – Verovskova 57 – SI-1526 Ljubljana – Slovenia

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 – 39179 Barleben – Germania

LEK SA - Ul. Domaniewska 50 C – 02-672 Warszawa – Polonia

Lek Pharmaceuticals d.d Trimlini 2D 9220 Lendava Slovenia.

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio economico europeo e nel Regno Unito (Irlanda del Nord) con le seguenti denominazioni:

Austria:	Topiramat Sandoz 25 mg - Filmdragerade tabletter Topiramat Sandoz 50 mg – Filmdragerade tabletter Topiramat Sandoz 100 mg - Filmdragerade tabletter Topiramat Sandoz 200 mg - Filmdragerade tabletter
Belgio:	Topiramate Sandoz 25 mg filmomhulde tabletten Topiramate Sandoz 50 mg filmomhulde tabletten Topiramate Sandoz 100 mg filmomhulde tabletten Topiramate Sandoz 200 mg filmomhulde tabletten
Italia:	TOPIRAMATO SANDOZ 25 mg compresse rivestite con film TOPIRAMATO SANDOZ 50 mg compresse rivestite con film TOPIRAMATO SANDOZ 100 mg compresse rivestite con film TOPIRAMATO SANDOZ 200 mg compresse rivestite con film
Norvegia:	Topiramat Sandoz 25 mg filmdrasjerte tabletter Topiramat Sandoz 50 mg filmdrasjerte tabletter Topiramat Sandoz 100 mg filmdrasjerte tabletter Topiramat Sandoz 200 mg filmdrasjerte tabletter
Paesi Bassi:	Topiramaat Sandoz 25 mg tabletten Topiramaat Sandoz 100 mg tabletten Topiramaat Sandoz 200 mg tabletten
Portogallo:	Topiramato SANDOZ 25 mg Comprimidados Topiramato SANDOZ 50 mg Comprimidados Topiramato SANDOZ 100 mg Comprimidados Topiramato SANDOZ 200 mg Comprimidados
Repubblica Ceca:	Topiramat Sandoz 25 mg, tbl. Topiramat Sandoz 50 mg, tbl. Topiramat Sandoz 100 mg, tbl. Topiramat Sandoz 200 mg, tbl.
Svezia:	Topiramat 1A Farma 25 mg filmdragerade tabletter Topiramat 1A Farma 50 mg filmdragerade tabletter Topiramat 1A Farma 100 mg filmdragerade tabletter Topiramat 1A Farma 200 mg filmdragerade tabletter

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato a Ottobre 2022