

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

Lercanidipina ratiopharm Italia 10 mg compresse rivestite con film

lercanidipina cloridrato

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è Lercanidipina ratiopharm Italia e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Lercanidipina ratiopharm Italia
3. Come prendere Lercanidipina ratiopharm Italia
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Lercanidipina ratiopharm Italia
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Lercanidipina ratiopharm Italia e a cosa serve

Lercanidipina ratiopharm Italia appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati bloccanti del canale del calcio (derivati della diidropiridina), che riducono la pressione sanguigna. Lercanidipina ratiopharm Italia è usato per trattare la **pressione arteriosa alta** da lieve a moderata, denominata anche ipertensione, negli adulti al di sopra dei 18 anni (non è raccomandato nei bambini di età inferiore ai 18 anni).

2. Cosa deve sapere prima di prendere Lercanidipina ratiopharm Italia

Non prenda Lercanidipina ratiopharm Italia

- Se è **allergico** alla lercanidipina cloridrato, a medicinali strettamente correlati a Lercanidipina ratiopharm Italia (ad esempio amlodipina, nicardipina, felodipina, isradipina, nifedipina o lacipidina) o ad **uno qualsiasi degli altri componenti** di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- Se soffre di **determinate malattie cardiache**:
 - insufficienza cardiaca non trattata
 - ostruzione al flusso di sangue dal cuore
 - angina instabile (dolore al torace che si verifica a riposo o che aumenta progressivamente)
 - infarto da meno di un mese
- Se ha **gravi problemi al fegato**
- Se ha **gravi problemi renali o è sottoposto a dialisi**
- Se sta prendendo **medicinali** che inibiscono il metabolismo epatico, ad esempio :
 - medicinali antimicotici (quali chetoconazolo o itraconazolo);
 - antibiotici macrolidi (quali eritromicina, troleandomicina o claritromicina);
 - antivirali (quali ritonavir).
- Se sta prendendo un altro farmaco denominato ciclosporina (usato dopo i trapianti per prevenire il rigetto d'organo).
- Con il pompelmo o succo di pompelmo.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Lercanidipina ratiopharm Italia se:

- Ha problemi cardiaci
- Ha problemi al fegato o ai reni

Deve informare il medico se pensa di essere (o di poter rimanere) **incinta o sta allattando** (vedere paragrafo “Gravidanza, Allattamento e Fertilità”)

Bambini e adolescenti

La sicurezza e l'efficacia di Lercanidipina ratiopharm Italia non sono state stabilite **nei bambini fino ai 18 anni di età**.

Altri medicinali e Lercanidipina ratiopharm Italia

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale. Questo perché quando Lercanidipina ratiopharm Italia viene assunta con altri medicinali l'effetto di Lercanidipina ratiopharm Italia o dell'altro farmaco può essere modificato o alcuni effetti indesiderati possono verificarsi più frequentemente (vedere anche paragrafo 2 "Non prenda Lercanidipina ratiopharm Italia").

In particolare, informi il medico o il farmacista se sta assumendo qualcuno dei seguenti farmaci:

- **fenitoina, fenobarbital o carbamazepina** (farmaci per l'epilessia)
- **rifampicina** (un farmaco per il trattamento della tubercolosi)
- **astemizolo o terfenadina** (farmaci per il trattamento delle allergie)
- **amiodarone, chinidina o sotalolo** (farmaci per il trattamento della tachicardia)
- **midazolam** (un farmaco che aiuta a dormire)
- **digossina** (un farmaco per il trattamento dei problemi cardiaci)
- **beta-bloccanti** per es. **metoprololo** (un medicinale per il trattamento della pressione alta, insufficienza cardiaca e anomalie del ritmo cardiaco)
- **cimetidina** (più di 800 mg al giorno, un medicinale per ulcere, indigestione o bruciore di stomaco)
- **simvastatina** (un medicinale per abbassare il colesterolo nel sangue)
- altri farmaci per il trattamento della pressione arteriosa alta
- **chetoconazolo o itraconazolo** (farmaci antimicotici)
- **eritromicina, troleandomicina o claritromicina** (antibiotici macrolidi)
- **ritonavir** (antivirali)
- **ciclosporina** (un medicinale che riduce la resistenza dell'organismo alle malattie)

Lercanidipina ratiopharm Italia con cibi, bevande e alcol

- Un pasto ricco di grassi aumenta significativamente i livelli ematici del medicinale (vedere il paragrafo 3 "Come prendere la Lercanidipina ratiopharm Italia").
- L'alcool può aumentare l'effetto di Lercanidipina ratiopharm Italia. **Non assuma alcool** durante il trattamento con Lercanidipina ratiopharm Italia.
- Lercanidipina ratiopharm Italia **non deve essere assunta con polpello o con succo di polpello** (possono aumentare l'effetto ipotensivo). Vedere paragrafo 2 “Non prenda Lercanidipina ratiopharm Italia”).

Gravidanza, allattamento e fertilità

Lercanidipina ratiopharm Italia non è raccomandata in caso di gravidanza, non deve essere usata durante l'allattamento. Non ci sono dati sull'uso della Lercanidipina ratiopharm Italia in donne in gravidanza e in allattamento. Se è in incinta o sta allattando, se non sta usando nessun metodo contraccettivo, se pensa di poter essere incinta o sta programmando di avere un bambino, chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Se si verificano capogiro, debolezza o stanchezza con questo medicinale, non guidi un veicolo e non usi macchinari.

Lercanidipina ratiopharm Italia con film contiene sodio

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa, cioè essenzialmente “senza sodio”.

3. Come prendere Lercanidipina ratiopharm Italia

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Adulti: la dose raccomandata è di 10 mg una volta al giorno, alla stessa ora, preferibilmente di mattina **almeno 15 minuti prima di colazione**. Il medico può consigliarle di aumentare la dose a 20 mg una volta al giorno, se necessario (vedere il paragrafo 2 “Lercanidipina ratiopharm Italia con cibi, bevande e alcol”).

La compressa dovrebbe essere preferibilmente ingerita intera con un po' d'acqua.

Anziani: non è necessaria alcuna modifica della dose giornaliera. Tuttavia, prestare particolare attenzione quando si inizia il trattamento.

Pazienti con problemi di fegato o reni: in questi pazienti, prestare particolare attenzione all’inizio del trattamento; un aumento della dose giornaliera a 20 mg deve essere effettuato con cautela.

Uso nei bambini

Questo medicinale non deve essere usato nei bambini al di sotto dei 18 anni.

Se prende più Lercanidipina ratiopharm Italia di quando deve

Non superi la dose prescritta.

Se assume una quantità maggiore della dose prescritta, consulti un medico o vada direttamente in ospedale. Porti con sé la confezione.

Prendere più della dose corretta può causare un abbassamento eccessivo della pressione arteriosa e un battito cardiaco irregolare o accelerato.

Se dimentica di prendere Lercanidipina ratiopharm Italia

Se dimentica di prendere la sua compressa, non prenda quella dose e proceda con il trattamento come prima. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Lercanidipina ratiopharm Italia

Se interrompe il trattamento con Lercanidipina ratiopharm Italia, la sua pressione arteriosa può aumentare di nuovo. Consulti il suo medico prima di interrompere il trattamento.

Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino. Con questo medicinale si possono verificare i seguenti effetti indesiderati:

Alcuni effetti indesiderati possono essere gravi:

Se si verifica uno qualsiasi di questi effetti indesiderati, contatti immediatamente il medico.

Rari (possono interessare fino a 1 persona su 1.000): angina pectoris (per es. costrizione toracica causata da insufficiente apporto di sangue al cuore), reazioni allergiche (i sintomi comprendono prurito, rash, orticaria), svenimento.

Pazienti con angina pectoris pre-esistente possono manifestare un aumento della frequenza, della durata o della gravità di questi attacchi acuti, con il gruppo di farmaci a cui appartiene Lercanidipina ratiopharm Italia. Si possono osservare casi isolati di infarto.

Altri possibili effetti indesiderati

Comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10): mal di testa, battito cardiaco accelerato, sensazione di battito cardiaco veloce o irregolare (palpitazioni), improvviso arrossamento del viso, del collo o della parte superiore del torace (arrossamento), gonfiore alla caviglia.

Non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100): capogiri, caduta della pressione sanguigna, bruciore di stomaco, nausea, mal di stomaco, eruzione cutanea, prurito, dolore muscolare, passaggio di grandi quantità di urina, sensazione di debolezza o stanchezza.

Rari (possono interessare fino a 1 persona su 1.000): sonnolenza, vomito, diarrea, orticaria, aumento della frequenza urinaria, dolore toracico.

Non noti (la frequenza non può essere stimata dai dati disponibili): gonfiore alle gengive, alterazioni della funzionalità epatica (rilevate da esami del sangue), liquido torbido (quando si esegue la dialisi attraverso un catetere nell'addome), gonfiore del viso, delle labbra, della lingua o della gola che può causare difficoltà a respirare o a deglutire.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Lercanidipina ratiopharm Italia

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata su ciascun blister e sull'imballaggio esterno dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non conservare a temperatura superiore a 30 °C.

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Lercanidipina ratiopharm Italia

- Il principio attivo è la lercanidipina cloridrato.
Ogni compressa rivestita con film contiene 10 mg di lercanidipina cloridrato, equivalenti a 9,4 mg di lercanidipina.
- Gli altri componenti sono
Nucleo della compressa:
amido di mais; sodio amido glicolato (tipo A); silice colloidale anidra; cellulosa microcristallina; poloxamer 188; sodio stearil fumarato; macrogol 6000.
Film di rivestimento:
ipromellosa; macrogol 6000; ossido di ferro giallo (E172); titanio diossido (E171).

Descrizione dell'aspetto di Lercanidipina ratiopharm Italia e contenuto della confezione

Le compresse di Lercanidipina ratiopharm Italia rivestite con film sono rotonde, biconvesse, di colore giallo, con linea di frattura su un lato e lisce sull'altro. La linea di frattura sulla compressa serve per agevolarne la rottura al fine di ingerire la compressa più facilmente e non per dividerla in dosi uguali.

Confezioni: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 35, 50, 56, 60, 98, 100 compresse rivestite con film.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Teva B.V. - Swensweg 5 - 2031 GA Haarlem - Paesi Bassi

Produttore responsabile del rilascio dei lotti

Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren Germania

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il Marzo 2022