

Manidipina EG 10 mg compresse
Manidipina EG 20 mg compresse

FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE

Manidipina EG 10 mg compresse
Manidipina EG 20 mg compresse

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale.

- Conservi questo foglio illustrativo. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi perché potrebbe essere pericoloso.
- Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è Manidipina EG e a cosa serve
2. Prima di prendere Manidipina EG
3. Come prendere Manidipina EG
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Manidipina EG
6. Altre informazioni

1. COS'È MANIDIPINA EG E A COSA SERVE

Le compresse di Manidipina EG contengono 10 mg di principio attivo manidipina, che appartiene ad un gruppo di medicinali detti calcio-antagonisti diidropiridinici.

Le compresse di Manidipina EG contengono 20 mg di principio attivo manidipina, che appartiene ad un gruppo di medicinali detti calcio-antagonisti diidropiridinici.

La manidipina è indicata per il trattamento dell'ipertensione essenziale da lieve a moderata (ipertensione arteriosa).

La manidipina agisce rilassando i vasi sanguigni in modo da ridurre la pressione.

2. PRIMA DI PRENDERE MANIDIPINA EG

Non prenda Manidipina EG:

- se è allergico (ipersensibile) alla manidipina o ad altri calcio-antagonisti o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- Se soffre di angina instabile (dolore al torace non causato da stress o esercizio o dolore notturno) o se ha avuto un infarto miocardico da meno di 4 settimane
- Se soffre di insufficienza cardiaca congestizia non trattata
- Se soffre di grave insufficienza renale (clearance della creatinina < 10 ml/min)
- Se soffre di insufficienza epatica da moderata a grave.
- Se è un bambino.

Faccia particolare attenzione con Manidipina EG

- Se soffre di danno epatico lieve, poiché gli effetti della manidipina possono aumentare (vedere paragrafo 3 "Come prendere Manidipina EG")
- Se è anziano è richiesta una riduzione della dose (vedere paragrafo 3 "Come prendere Manidipina EG")
- Se soffre di malattie cardiache
- Se prende altri medicinali (vedere "Assunzione di Manidipina EG con altri medicinali").

Altri medicinali e Manidipina EG

Informi il suo medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, compresi quelli senza prescrizione medica o medicinali per una delle seguenti condizioni:

Manidipina EG 10 mg compresse
Manidipina EG 20 mg compresse

- Ipertensione, come diuretici e/o beta-bloccanti
- Infezioni virali e batteriche
- Disturbi mentali
- Battito cardiaco irregolare (come amiodarone, chinidina, digossina)
- Allergie (come terfenadina, astemizolo)

Manidipina EG con cibi e bevande

I pazienti non devono consumare alcol o succo di pompelmo durante il trattamento con la manidipina.

Gravidanza e allattamento

Manidipina EG non deve essere usata durante la gravidanza. L'uso della manidipina deve essere evitato durante l'allattamento. Se l'uso della manidipina è necessario, l'allattamento deve essere sospeso.

Fertilità

Alterazioni della testa degli spermatozoi che possono compromettere la fecondazione, sono state riportate in alcuni pazienti trattati con calcio-antagonisti.

Chieda consiglio al medico prima di prendere qualsiasi medicinale.

Guida di veicoli ed utilizzo di macchinari

Faccia attenzione mentre guida o usa macchinari perché possono comparire capogiri.

Manidipina EG contiene lattosio

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

3. COME PRENDERE MANIDIPINA EG

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico.

Se sente che l'azione di Manidipina EG è troppo forte o troppo debole, ne parli con il medico o il farmacista.

I bambini non devono prendere la manidipina.

Il medico le indicherà la durata del trattamento. Non smetta il trattamento fino a quando non glielo dice il medico.

Le compresse vanno prese al mattino dopo la colazione, con un po' di liquido e senza masticarle.

La dose abituale iniziale è di 10 mg una volta al giorno.

Se dopo 2 - 4 settimane di trattamento l'effetto antipertensivo della manidipina fosse insufficiente, il medico può aumentare la dose a 20 mg, una volta al giorno.

Se è anziano o soffre di disfunzioni renali o epatiche, il medico può prescrivere una dose ridotta (10 mg una volta al giorno).

Se prende più Manidipina EG di quanto deve

Se lei (o qualcun altro) ha ingerito più compresse contemporaneamente, o se pensa che un bambino abbia ingerito qualche compressa, contatti immediatamente il Pronto Soccorso del più vicino ospedale o il suo medico. Come per altri calcio-antagonisti si presume che un sovradosaggio possa causare un'eccessiva vasodilatazione periferica che porta ad un abbassamento della pressione sanguigna e ad un aumento della frequenza cardiaca.

Se dimentica di prendere Manidipina EG

Se ha dimenticato di prendere una dose, la prenda non appena possibile e poi ritorni al suo schema regolare.

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Manidipina EG

Contatti il suo medico prima di smettere di prendere Manidipina EG.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

Manidipina EG 10 mg compresse
Manidipina EG 20 mg compresse

4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, la manidipina può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino. Gli effetti indesiderati sono di solito lievi e temporanei. Comunque alcuni effetti possono diventare gravi e richiedere cure mediche.

Comune ($\geq 1/100$, $< 1/10$): mal di testa, capogiri, vertigini, gonfiore causato da ritenzione idrica, palpitazioni, vampate di calore.

Non comune ($\geq 1/1.000$, $< 1/100$): sensazione di formicolio sulla pelle, debolezza o mancanza di energia, battito cardiaco accelerato, abbassamento della pressione, difficoltà di respiro, nausea, vomito, stitichezza, secchezza della bocca, disturbi digestivi, eruzione cutanea, eczema, aumento degli enzimi epatici e/o aumento dei parametri renali (il suo medico è a conoscenza di ciò).

Raro ($\geq 1/10.000$, $< 1/1.000$): sonnolenza, torpore, dolore al torace, angina, aumento della pressione sanguigna, dolore allo stomaco, dolore addominale, arrossamento della pelle, prurito ed irritabilità.

Molto raro ($< 1/10.000$): infarto del miocardio, infiammazione e gonfiore delle gengive che in genere scompaiono dopo la sospensione del trattamento. In casi isolati, in pazienti con angina pectoris pre-esistente, può verificarsi un aumento della frequenza, della durata e dell'intensità di questi attacchi.

Non nota: la sindrome extra-piramidale è stata riportata con alcuni calcio-antagonisti, dolore muscolare, gonfiore del seno con o senza tensione mammaria negli uomini (ginecomastia).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. COME CONSERVARE MANIDIPINA EG

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione dopo la dicitura "Scadenza". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede particolari condizioni di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. ALTRE INFORMAZIONI

Cosa contiene Manidipina EG 10 mg

Il principio attivo è la manidipina cloridrato 10 mg.

Gli altri componenti sono: lattosio monoidrato, amido di mais, idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato, riboflavina.

Cosa contiene Manidipina EG 20 mg

Il principio attivo è la manidipina cloridrato 20 mg.

Gli altri componenti sono: lattosio monoidrato, amido di mais, idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato, riboflavina.

Descrizione dell'aspetto di Manidipina EG e contenuto della confezione

Manidipina EG è disponibile in 2 dosaggi: 10 e 20 mg

Le compresse da 10 mg sono rotonde, convesse, di colore giallo, con una linea mediana di frattura.

Le compresse da 20 mg sono ovali, convesse, di colore giallo, con una linea mediana di frattura.

Manidipina EG 10 mg compresse
Manidipina EG 20 mg compresse

Manidipina EG è disponibile nelle seguenti confezioni:

10 mg: 28 compresse

20 mg: 28 compresse

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio:

EG S.p.A., Via Pavia 6, 20136 Milano - Italia

Produttore

Abiogen Pharma S.p.A., Via Meucci 36, 56121 Ospedaletto Pisa, Italia

Doppel Farmaceutici S.r.l., Via Volturno 48, 20089 Rozzano MI, Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 27 Aprile 2021