

Foglio illustrativo: Informazioni per il paziente

Perindopril Teva Italia 2,5 mg compresse rivestite con film
Perindopril Teva Italia 5 mg compresse rivestite con film
Perindopril Teva Italia 10 mg compresse rivestite con film

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale poiché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio

1. Cos'è Perindopril Teva Italia e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Perindopril Teva Italia
3. Come prendere Perindopril Teva Italia
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Perindopril Teva Italia
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Perindopril Teva Italia e a cosa serve

Perindopril Teva Italia è un inibitore dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE). Questo tipo di medicinale dilata i vasi sanguigni, aiutando il cuore a pompare il sangue attraverso di essi.

Perindopril Teva Italia è usato per:

- il trattamento della **pressione sanguigna alta** (ipertensione);
- [dosaggi da 2,5 mg e 5 mg] il trattamento dell'**insufficienza cardiaca** (una condizione in cui il cuore non riesce a pompare abbastanza sangue per soddisfare le esigenze dell'organismo);
- la riduzione del rischio di eventi cardiaci, come un attacco cardiaco, in pazienti affetti da **coronaropatia stabile** (una malattia in cui l'afflusso di sangue al cuore è ridotto o ostacolato) e che hanno già subito un attacco cardiaco e/o un intervento chirurgico per migliorare l'afflusso di sangue al cuore dilatando i vasi che alimentano il cuore.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Perindopril Teva Italia

Non prenda Perindopril Teva Italia

- se è allergico al perindopril, ad un qualsiasi altro ACE inibitore o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- se ha sofferto di sintomi quali sibilo, gonfiore del viso, della lingua o della gola, prurito intenso o gravi eruzioni cutanee con un precedente trattamento con un ACE-inibitore e se lei o un suo familiare ha sofferto di questi sintomi in qualsiasi altra circostanza (si tratta di un disturbo detto angioedema)
- se è in stato di gravidanza da più di tre mesi. (È meglio evitare Perindopril Teva Italia anche nella fase iniziale della gravidanza – vedere il paragrafo 2: Gravidanza, allattamento e fertilità)
- se soffre di diabete o la sua funzione renale è compromessa ed è in trattamento con un medicinale che abbassa la pressione del sangue, contenente aliskiren
- se è sottoposto a dialisi o a qualunque tipo di filtrazione ematica. A seconda del macchinario utilizzato, la terapia con Perindopril Teva Italia potrebbe non essere indicata per lei

Perindopril Teva Italia

- se ha problemi ai reni, per cui l'afflusso di sangue ai reni è ridotto (stenosi dell'arteria renale)
- se ha assunto o sta assumendo sacubitril/valsartan, un medicinale usato per trattare un tipo di insufficienza cardiaca a lungo termine (cronica) negli adulti, in quanto ciò aumenta il rischio di angioedema (rapido rigonfiamento sotto la pelle in zone come la gola) (vedere paragrafo "Avvertenze e precauzioni" e "Altri medicinali e Perindopril Teva Italia).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Perindopril Teva Italia

- se ha una stenosi aortica (il restringimento del principale vaso sanguigno che ha origine dal cuore) o soffre di cardiomiopatia ipertrofica (una malattia del muscolo cardiaco) o di stenosi dell'arteria renale (il restringimento dell'arteria che apporta sangue ai reni),
- se soffre di qualsiasi altro problema cardiaco,
- se ha problemi al fegato,
- se ha problemi ai reni o si sottopone alla dialisi,
- se ha un aumento anomalo dei livelli ematici di un ormone chiamato aldosterone (aldosteronismo primario),
- se soffre di una malattia vascolare del collagene (una malattia del tessuto connettivo), come il lupus eritematoso sistemico o la sclerodermia,
- se ha il diabete,
- se è sottoposto a una dieta povera di sali o usa sostituti del sale contenenti potassio,
- se deve sottoporsi all'anestesia e/o ad un intervento chirurgico maggiore,
- se deve sottoporsi alla LDL-afesi (l'asportazione del colesterolo dal sangue mediante un apposito macchinario),
- se sta per sottoporsi a un trattamento di desensibilizzazione per ridurre gli effetti di un'allergia alle punture di ape o vespa,
- se ha avuto di recente diarrea o vomito o è disidratato,
-
- se è di origine nera, in quanto può avere un rischio maggiore di angioedema e questo farmaco può essere meno efficace nel ridurre la pressione sanguigna rispetto ai pazienti non neri,
- se sta assumendo uno dei seguenti medicinali usati per trattare la pressione alta del sangue:
 - un "antagonista del recettore dell'angiotensina II" (AIIRA) (anche noti come sartani - per esempio valsartan, telmisartan, irbesartan), in particolare se soffre di problemi renali correlati al diabete.
 - aliskiren.

Il medico può controllare la sua funzionalità renale, la pressione del sangue, e la quantità di elettroliti (ad esempio il potassio) nel sangue a intervalli regolari.

Vedere anche quanto riportato alla voce "Non prenda Perindopril Teva Italia".

- se sta assumendo uno qualsiasi dei seguenti farmaci, il rischio di angioedema può essere aumentato:
 - racecadotril (utilizzato per trattare la diarrea),
 - sirolimus, everolimus, temsirolimus e altri medicinali appartenenti alla classe dei cosiddetti inibitori di mTOR (utilizzati per prevenire il rigetto di organi trapiantati e per trattare il cancro),
 - sacubitril (disponibile come associazione a dose fissa con valsartan), utilizzato nel trattamento a lungo termine dell'insufficienza cardiaca,
 - linagliptin, saxagliptin, sitagliptin, vildagliptin e altri medicinali appartenenti alla classe delle cosiddette gliptine (utilizzate per trattare il diabete).

Angioedema

In pazienti trattati con ACE inibitori, incluso Perindopril Teva Italia, è stato riportato angioedema (una grave reazione allergica con gonfiore del viso, delle labbra, della lingua o della gola con difficoltà a deglutire o respirare). Questo può verificarsi in qualsiasi momento durante il trattamento. Se sviluppa tali sintomi, deve smettere di assumere Perindopril Teva Italia e consultare immediatamente un medico. Vedere anche il paragrafo "Possibili effetti indesiderati".

Perindopril Teva Italia

Deve informare il medico se pensa di essere in stato di gravidanza (o se vi è la possibilità di dare inizio ad una gravidanza). Perindopril Teva Italia non è raccomandato all'inizio della gravidanza, e non deve essere assunto se è in stato di gravidanza da più di tre mesi, poiché esso può causare grave danno al bambino se preso in questo periodo (vedere il paragrafo "Gravidanza, allattamento e fertilità").

Bambini e adolescenti

L'uso di Perindopril Teva Italia nei bambini e negli adolescenti fino a 18 anni di età non è raccomandato.

Altri medicinali e Perindopril Teva Italia

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Il trattamento con Perindopril Teva Italia può risentire dell'effetto di altri medicinali. Il suo medico potrebbe dover modificare la dose e/o prendere altre precauzioni. Questi includono:

- altri medicinali per la pressione sanguigna elevata, tra cui un antagonista del recettore dell'angiotensina II (AIIIRA), aliskiren (vedere anche quanto riportato alla voce "Non prenda Perindopril Teva Italia" e "Avvertenze e precauzioni") o i diuretici (medicinali che aumentano la quantità di urina prodotta dai reni);
- farmaci risparmiatori di potassio (ad es. triamterene, amiloride), integratori del potassio o sostituti del sale contenenti potassio, o altri medicinali che possono aumentare il potassio nel sangue (come eparina, un medicinale usato per fluidificare il sangue e prevenire la formazione di coaguli; trimetoprim e cotrimoxazolo noto anche come trimetoprim/sulfametossazolo per trattare infezioni provocate da batteri);
- farmaci risparmiatori di potassio usati per il trattamento dell'insufficienza cardiaca: eplerenone e spironolattone a dosi comprese tra 12,5 mg e 50 mg al giorno;
- litio per i disturbi maniacali o la depressione;
- farmaci antinfiammatori non steroidei (ad es., ibuprofene) usati contro il dolore o acido acetilsalicilico ad alto dosaggio, una sostanza presente in molti medicinali usati per alleviare il dolore e abbassare la febbre, nonché per prevenire la formazione di coaguli;
- medicinali per il diabete (quali insulina o metformina);
- baclofene (usato per il trattamento della rigidità muscolare in malattie quali la sclerosi multipla);
- medicinali per il trattamento dei disturbi mentali, come depressione, ansia, schizofrenia, ecc. (ad es. antidepressivi triciclici, antipsicotici);
- immunosoppressori (medicinali che riducono il meccanismo di difesa dell'organismo) usati per il trattamento di disturbi autoimmuni o a seguito di un trapianto chirurgico (ad es., ciclosporina, tacrolimus);
- estramustina (usato nella terapia del cancro);
- medicinali utilizzati solitamente per il trattamento della diarrea (racecadotril) o per evitare il rigetto di organi trapiantati (sirolimus, everolimus, temsirolimus e altri medicinali appartenenti alla classe degli inibitori di mTOR). Vedere il paragrafo "Avvertenze e precauzioni".
- sacubitril/valsartan (utilizzato per il trattamento a lungo termine dell'insufficienza cardiaca). Vedere quanto riportato alla voce "Non prenda Perindopril Teva Italia" e "Avvertenze e precauzioni";
- allopurinolo (utilizzato per il trattamento della gotta);
- procainamide (per il trattamento del battito cardiaco irregolare);
- vasodilatatori, inclusi i nitrati (prodotti che allargano i vasi sanguigni);
- medicinali usati per il trattamento della pressione sanguigna bassa, di shock o asma (ad es., efedrina, noradrenalina o adrenalina),
- sali di oro, specialmente con somministrazione endovenosa (usati nel trattamento dei sintomi dell'artrite reumatoide).

Perindopril Teva Italia con cibi e bevande

Perindopril Teva Italia va assunto preferibilmente prima di un pasto.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Gravidanza

Deve informare il medico se pensa di essere in stato di gravidanza (o se vi è la possibilità di dare inizio ad una gravidanza). Di norma il medico le consiglierà di interrompere l'assunzione di Perindopril Teva Italia prima di dare inizio alla gravidanza o appena verrà a conoscenza di essere in stato di gravidanza e le consiglierà di prendere un altro medicinale al posto di Perindopril Teva Italia.

Perindopril Teva Italia non è raccomandato all'inizio della gravidanza, e non deve essere assunto se è in stato di gravidanza da più di tre mesi, poiché esso può causare grave danno al bambino se preso dopo il terzo mese di gravidanza.

Allattamento

Informi il medico se sta allattando o se sta per iniziare l'allattamento. Perindopril Teva Italia non è raccomandato per le donne che stanno allattando e il medico può scegliere un altro trattamento se desidera allattare, specialmente se il suo bambino è neonato o è nato prematuro.

Fertilità

Gli effetti del perindopril sulla fertilità umana non sono noti.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Generalmente, Perindopril Teva Italia non influenza lo stato di vigilanza, ma in alcuni pazienti possono verificarsi capogiri o debolezza causati dalla bassa pressione sanguigna. Se si verificano questi effetti, la capacità di guidare veicoli o utilizzare macchinari può essere compromessa.

Perindopril Teva Italia contiene lattosio

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Perindopril Teva Italia contiene sodio

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa, cioè essenzialmente 'senza sodio'.

3. Come prendere Perindopril Teva Italia

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi, consulti il medico o il farmacista.

Deglutisca la compressa insieme a un bicchiere d'acqua, preferibilmente alla stessa ora ogni giorno, al mattino, prima del pasto. Il medico deciderà la dose corretta per lei.

Le dosi raccomandate sono le seguenti.

Pressione sanguigna elevata: la dose raccomandata consigliata iniziale e di mantenimento è di 5 mg una volta al giorno. Dopo un mese di trattamento, la dose può essere aumentata a 10 mg una volta al giorno, se necessario. La dose di 10 mg al giorno è la dose massima raccomandata per la pressione sanguigna elevata.

Se ha 65 anni o più, la dose iniziale raccomandata è di 2,5 mg una volta al giorno. Dopo un mese di trattamento, la dose può essere aumentata a 5 mg una volta al giorno e poi, se necessario, a 10 mg una volta al giorno.

[Dosaggi da 2,5 mg e 5 mg] Insufficienza cardiaca: la dose iniziale raccomandata è di 2,5 mg una volta al giorno. Dopo due settimane, la dose può essere aumentata a 5 mg una volta al giorno, che è la dose massima raccomandata per l'insufficienza cardiaca.

Perindopril Teva Italia

Coronaropatia stabile: la dose iniziale raccomandata è di 5 mg una volta al giorno. Dopo due settimane, la dose può essere aumentata a 10 mg una volta al giorno, che è la dose massima raccomandata per questa indicazione.

Se ha 65 anni o più, la dose iniziale raccomandata è di 2,5 mg una volta al giorno. Dopo una settimana di trattamento, la dose può essere aumentata a 5 mg una volta al giorno e, dopo un'altra settimana, a 10 mg una volta al giorno.

Uso nei bambini e negli adolescenti

Non è raccomandato l'uso nei bambini e negli adolescenti.

[Dosaggio di 5 mg]:

La compressa può essere divisa in dosi uguali.

Se prende più Perindopril Teva Italia di quanto deve

Se prende troppe compresse, contatti immediatamente il medico o il pronto soccorso più vicino. In caso di sovradosaggio, l'effetto più probabile è un calo della pressione sanguigna che può provocare capogiri o svenimento. Se questo dovesse succedere, sdraiarsi con le gambe sollevate può essere d'aiuto.

Se dimentica di prendere Perindopril Teva Italia

È importante che assuma questo medicinale ogni giorno poiché il trattamento è più efficace se viene assunto in modo regolare. Tuttavia, se dovesse dimenticare di prendere una dose di Perindopril Teva Italia prenda semplicemente la dose successiva al solito orario. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Perindopril Teva Italia

Poiché in genere, il trattamento con Perindopril Teva Italia va proseguito per tutta la vita, prima di interrompere l'assunzione deve consultare il medico.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, Perindopril Teva Italia può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Smetta di prendere il medicinale e informi subito il medico, se nota la comparsa di uno qualsiasi dei seguenti effetti indesiderati che possono essere gravi:

- gonfiore di viso, labbra, bocca, lingua o gola, difficoltà a respirare (angioedema) (Vedere paragrafo 2 "Avvertenze e precauzioni") (Non comune – può interessare fino a 1 persona su 100),
- forti capogiri o svenimenti dovuti a bassa pressione sanguigna (Comune – può interessare fino a 1 persona su 10),
- battito cardiaco inusualmente accelerato o irregolare non abituale, dolore al petto (angina) o infarto (Molto raro - può interessare fino a 1 persona su 10.000),
- debolezza delle braccia o delle gambe o problemi nel parlare che potrebbero essere segno di un possibile ictus (Molto raro - può interessare fino a 1 persona su 10.000),
- improvvisa dispnea, dolore al torace, respiro corto o difficoltà nella respirazione (broncospasmo) (Non comune – può interessare fino a 1 persona su 100),
- pancreas infiammato che può causare dolore addominale grave e dolore alla schiena accompagnato da sensazioni di forte malessere (Molto raro - può interessare fino a 1 persona su 10.000),
- ingiallimento della pelle o degli occhi (ittero) che potrebbe essere un segno di epatite (Molto raro - può interessare fino a 1 persona su 10.000),
- eruzioni cutanee che spesso iniziano con macchie rosse e pruriginose su viso, braccia o gambe (eritema multiforme) (Molto raro - può interessare fino a 1 persona su 10.000).

Perindopril Teva Italia

Informi il medico se nota uno qualsiasi dei seguenti effetti indesiderati:

Comune (può interessare fino a 1 persona su 10):

- mal di testa,
- capogiri,
- vertigini,
- formicolio,
- disturbi della vista,
- tinnito (sensazione di rumori nelle orecchie),
- tosse,
- respiro affannoso (dispnea),
- patologie gastrointestinali (nausea, vomito, dolore addominale, alterazioni del gusto, dispepsia o difficoltà digestive, diarrea, stipsi),
- reazioni allergiche (quali eruzioni cutanee e prurito),
- crampi muscolari,
- sensazione di spossatezza.

Non comune (può interessare fino a 1 persona su 100):

- sbalzi d'umore,
- disturbi del sonno,
- depressione,
- bocca secca,
- prurito intenso o gravi eruzioni cutanee,
- formazione di gruppi di vesciche sulla pelle,
- problemi renali,
- impotenza,
- sudorazione,
- eccesso di eosinofili (un tipo di globuli bianchi),
- sonnolenza,
- svenimento,
- palpitazioni,
- tachicardia,
- vasculite (infiammazione dei vasi sanguigni),
- reazioni di fotosensibilizzazione (aumentata sensibilità della pelle al sole),
- artralgia (dolore articolare),
- mialgia (dolore muscolare),
- dolore al petto,
- malessere,
- edema periferico,
- febbre,
- rischio di cadute,
- alterazione dei parametri di laboratorio: alto livello di potassio nel sangue reversibile con l'interruzione del trattamento, basso livello di sodio, ipoglicemia (livelli molto bassi di zucchero nel sangue) in caso di pazienti diabetici, aumento dell'urea plasmatica e aumento della creatinina plasmatica.

Raro (può interessare fino a 1 persona su 1.000):

- urine di colore scuro, sensazione di malessere (nausea) o stato di malessere (vomito), crampi muscolari, confusione e convulsioni. Questi sintomi possono essere riconducibili ad una condizione chiamata SIADH (sindrome da inappropriata secrezione dell'ormone antidiuretico).
- rossore,
- peggioramento della psoriasi,
- riduzione o assenza di urina, insufficienza renale acuta
- alterazioni dei parametri di laboratorio: aumento del livello degli enzimi epatici, alto livello di bilirubina sierica.

Molto raro (può interessare fino a 1 persona su 10.000):

Perindopril Teva Italia

- confusione,
- polmonite eosinofila (un raro tipo di polmonite),
- rinite (naso tappato o che cola),
- cambiamento nei valori del sangue quali un abbassamento del numero dei globuli bianchi e dei globuli rossi, un abbassamento dell'emoglobina, un abbassamento del numero delle piastrine.

Frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

- colore anormale, intorpidimento e dolore alle dita delle mani o dei piedi (fenomeno di Raynaud).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.

Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Perindopril Teva Italia

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Dopo l'apertura, utilizzare entro 100 giorni.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sul flacone dopo "Scad".

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare il contenitore ben chiuso per proteggerlo dalla luce e dall'umidità. Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Perindopril Teva Italia

- Il principio attivo è perindopril tosilato. Ogni compressa rivestita con film contiene 1,704 mg di perindopril (corrispondenti a 2,5 mg di perindopril tosilato) o 3,408 mg di perindopril (corrispondenti a 5 mg di perindopril tosilato) o 6,816 mg di perindopril (corrispondenti a 10 mg di perindopril tosilato).
- Gli altri componenti sono lattosio monoidrato, amido di mais, sodio idrogeno carbonato, amido pregelatinizzato, povidone K30, magnesio stearato, poli(vinil alcol) - parzialmente idrolizzato, titanio biossido E171, macrogol 3350, talco e, per le compresse da 5 mg e 10 mg, indigo carmine E132, blu brillante FCF E133, ferro ossido giallo E172 e giallo di chinolina E104.

Descrizione dell'aspetto di Perindopril Teva Italia e contenuto della confezione

Le compresse di Perindopril Teva Italia 2,5 mg sono compresse di colore bianco, rotonde, biconvesse, rivestite con film di 5 mm circa di diametro, con inciso "T" su un lato e lisce sull'altro.

Le compresse di Perindopril Teva Italia 5 mg sono compresse di colore verde chiaro, a forma di capsula, biconvesse, rivestite con film di 4 mm circa di larghezza e 8 mm di lunghezza, con inciso "T" su un lato e lisce sull'altro, con linee di incisione su entrambi i bordi.

Perindopril Teva Italia

Le compresse di Perindopril Teva Italia 10 mg sono compresse di colore verde, rotonde, biconvesse, rivestite con film, di 8 mm circa di diametro, con inciso “10” su un lato e “T” sull’altro.

5 mg - Le compresse sono disponibili in confezioni da 10, 30, 60, 90, 90 (3x30) o 100 compresse rivestite con film.

2,5 mg e 10 mg – Le compresse sono disponibili in contenitori da 30, 60, 90, 90 (3 x 30) o 100 compresse rivestite con film.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e Produttore

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio

Teva Italia S.r.l.
Piazzale Luigi Cadorna, 4
20123 – Milano
Italia

Produttore

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Ungheria
Pharmachemie B.V. Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi
Teva Operations Poland Sp.z.o.o. ul. Mogilska 80, 31-546 Krakow, Polonia

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:

Belgio:	Perindopril Teva 2,5 mg filmomhulde tabletten, comprimés pelliculés, Filmtabletten Perindopril Teva 5 mg filmomhulde tabletten, comprimés pelliculés, Filmtabletten Perindopril Teva 10 mg filmomhulde tabletten, comprimés pelliculés, Filmtabletten
Bulgaria:	Zaprinel
Francia:	Perindopril Tosilate Teva
Ungheria:	Perindopril-tozilát Teva
Irlanda:	Perindopril Tosilate Teva
Italia:	Perindopril Teva Italia
Lituania:	Perindopril Teva 2,5mg/5mg/10mg plėvele dengtos tabletės
Paesi Bassi:	Perindopril tosilaat 2.5mg/5mg/10mg Teva
Polonia:	Perindopril Teva
Portogallo:	Perindopril Teva comprimido revestido por película
Romania:	Perindopril tosilat Teva 2,5 mg comprimate filmate Perindopril tosilat Teva 5 mg comprimate filmate Perindopril tosilat Teva 10 mg comprimate filmate

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il Luglio 2022