

Eletriptan Viatriis 20 mg compresse rivestite con film
Eletriptan Viatriis 40 mg compresse rivestite con film

Foglio illustrativo: Informazioni per l'utilizzatore

Eletriptan Viatriis 20 mg compresse rivestite con film Eletriptan Viatriis 40 mg compresse rivestite con film

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Eletriptan Viatriis e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Eletriptan Viatriis
3. Come prendere Eletriptan Viatriis
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Eletriptan Viatriis
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Eletriptan Viatriis e a che cosa serve

Eletriptan Viatriis contiene il principio attivo eletriptan. Eletriptan Viatriis appartiene a una classe di medicinali chiamati agonisti dei recettori della serotonina. La serotonina è una sostanza naturale che si trova nel cervello e che favorisce il restringimento dei vasi sanguigni.

Eletriptan Viatriis può essere usato per il trattamento dell'emicrania con o senza aura negli adulti. Prima dell'inizio dell'attacco emicranico, può attraversare una fase chiamata aura che comporta disturbi visivi, torpore e disturbi del linguaggio.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Eletriptan Viatriis

Non prenda Eletriptan Viatriis:

- Se è allergico (ipersensibile) a eletriptan o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- Se ha una grave malattia epatica o renale.
- Se soffre di ipertensione da moderata a grave o di ipertensione lieve non trattata.
- Se soffre o ha mai sofferto di problemi cardiaci [es. attacco cardiaco, angina, insufficienza cardiaca o significativa anormalità del ritmo cardiaco (aritmia), restringimento improvviso, temporaneo di una delle coronarie].
- Se soffre di deficit circolatorio (malattia vascolare periferica).
- Se ha avuto un ictus (anche lieve, durato solo pochi minuti o poche ore).
- Se ha assunto ergotamina o derivati dell'ergotamina (inclusa metisergide) nelle 24 ore prima o dopo assunzione di Eletriptan Viatriis.
- Se sta assumendo altri medicinali il cui nome termina con "triptan" (es. sumatriptan, rizatriptan, naratriptan, zolmitriptan, almotriptan e frovatriptan).

Si rivolga al medico e non assuma Eletriptan Viatriis se nel suo caso si verifica una delle condizioni sopra elencate o se si sia verificata nel passato.

Eletriptan Viatriis 20 mg compresse rivestite con film
Eletriptan Viatriis 40 mg compresse rivestite con film

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Eletriptan Viatriis se:

- ha il diabete.
- fuma o è in terapia sostitutiva a base di nicotina.
- è di sesso maschile e ha più di 40 anni.
- è di sesso femminile e in post-menopausa.
- lei o un suo familiare soffrono di malattia coronarica.
- le è stato detto che può avere un aumento del rischio di malattie cardiache, parli con il medico prima di usare Eletriptan Viatriis.

Uso ripetuto di medicinali per l'emicrania

L'utilizzo ripetuto di Eletriptan Viatriis o altri medicinali per il trattamento dell'emicrania per diversi giorni o settimane può causare cefalea cronica quotidiana. Informi il medico se si verifica questa condizione, poiché potrebbe aver bisogno di sospendere il trattamento.

Altri medicinali e Eletriptan Viatriis

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Assumere Eletriptan Viatriis con altri medicinali può causare effetti indesiderati gravi. Non usi Eletriptan Viatriis se:

- ha assunto ergotamina o derivati dell'ergotamina (inclusa metisergide) nelle 24 ore prima o dopo assunzione di Eletriptan Viatriis
- sta assumendo altri medicinali il cui nome termina per "triptan" (per esempio sumatriptan, rizatriptan, naratriptan, zolmitriptan, almotriptan e frovatriptan).

Alcuni medicinali possono influire sul meccanismo d'azione di Eletriptan Viatriis oppure Eletriptan Viatriis può ridurre l'efficacia di altri medicinali assunti contemporaneamente. Questi includono:

- Medicinali usati per il trattamento di infezioni fungine (es. ketoconazolo e itraconazolo).
- Medicinali usati per il trattamento di infezioni batteriche (es. eritromicina, claritromicina e josamicina).
- Medicinali usati per il trattamento di AIDS e HIV (es. ritonavir, indinavir e nelfinavir).

L'erba di S. Giovanni (*Hypericum perforatum*) non deve essere assunta in concomitanza con questo medicinale. Se già assume l'erba di S. Giovanni, consulti il medico prima di interrompere l'assunzione del preparato.

Informi il medico prima di iniziare il trattamento con eletriptan, se sta assumendo alcuni medicinali (comunemente chiamati SSRI* o SNRI**) per la depressione o altri disturbi mentali. Questi medicinali possono aumentare il rischio di sviluppare la sindrome serotoninergica durante l'uso combinato con alcuni medicinali per l'emicrania. Vedere il paragrafo 4 "Possibili effetti indesiderati" per avere più informazioni sui sintomi della sindrome serotoninergica.

*SSRI – inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina

**SNRI – inibitori della ricaptazione della serotonina e della norepinefrina

Eletriptan Viatriis con cibi e bevande

Eletriptan Viatriis può essere assunto prima o dopo cibi e bevande.

Gravidanza e allattamento

Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

Eletriptan Viatris 20 mg compresse rivestite con film
Eletriptan Viatris 40 mg compresse rivestite con film

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico prima di prendere questo medicinale.

Si raccomanda di evitare l'allattamento nelle 24 ore successive all'assunzione di questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Eletriptan Viatris oppure l'emicrania possono causare sonnolenza. Questo medicinale può anche causarle capogiri. Si raccomanda pertanto di evitare di guidare veicoli o utilizzare macchinari durante l'attacco di emicrania o dopo assunzione del medicinale.

Eletriptan Viatris contiene lattosio, il colorante giallo tramonto lacca di alluminio (E 110), e sodio

Il lattosio è un tipo di zucchero. Se le è stato detto dal medico che ha un'intolleranza ad alcuni zuccheri, contatti il medico prima di prendere questo medicinale.

Il colorante giallo tramonto lacca di alluminio (E 110) può causare reazioni allergiche.

Eletriptan Viatris 20 mg e 40 mg compresse rivestite con film contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa, cioè essenzialmente "senza sodio".

3. Come prendere Eletriptan Viatris

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi, consulti il medico o il farmacista.

Adulti

Questo medicinale può essere assunto in qualsiasi momento dopo l'inizio dell'attacco emicranico, ma è meglio assumerlo il prima possibile. **Comunque, assuma Eletriptan Viatris solo durante la fase emicranica, non lo assuma per prevenire l'attacco emicranico.**

- La dose abituale iniziale è una compressa da 40 mg.
- Ingerisca ogni compressa intera con un bicchiere d'acqua.
- Se la prima compressa non fa scomparire l'emicrania, non assuma una seconda compressa per lo stesso attacco emicranico.
- Se dopo la prima compressa l'emicrania scompare e poi ritorna, può assumere una seconda compressa. Tuttavia, dopo aver assunto la prima compressa deve attendere almeno 2 ore prima di prendere la seconda.
- Non deve assumere più di 80 mg (2 x 40 mg) nelle 24 ore.
- Se ritiene che la dose di una compressa da 40 mg non fa scomparire l'emicrania, informi il medico – lui/lei può decidere di aumentare la dose a due compresse da 40 mg per i futuri episodi.

Uso nei bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni

Le compresse di Eletriptan Viatris non sono raccomandate per i bambini e gli adolescenti di età inferiore ai 18 anni.

Anziani

Le compresse di Eletriptan Viatris non sono raccomandate per i pazienti al di sopra dei 65 anni di età.

Compromissione renale

Questo medicinale può essere utilizzato in pazienti con problemi renali da lievi a moderati. In questi pazienti si raccomanda una dose iniziale di 20 mg e una dose giornaliera complessiva di non più di 40 mg. Il medico le consiglierà quale dose assumere.

Compromissione epatica

Eletriptan Viatriis 20 mg compresse rivestite con film
Eletriptan Viatriis 40 mg compresse rivestite con film

Questo medicinale può essere usato in pazienti con problemi epatici da lievi a moderati. Non è richiesto un aggiustamento della dose per la compromissione epatica da lieve a moderata.

Se prende più Eletriptan Viatriis di quanto deve

Se accidentalmente prende troppo Eletriptan Viatriis, contatti subito il medico o si rechi al pronto soccorso più vicino. Porti sempre con sé la confezione del medicinale sia che siano rimaste delle compresse oppure no. Gli effetti indesiderati derivanti dall'assunzione di troppo Eletriptan Viatriis includono pressione sanguigna elevata e problemi cardiaci.

Se dimentica di prendere Eletriptan Viatriis

Se dimentica di prendere una dose, la prenda non appena se ne ricorda a meno che non sia ora di prendere la successiva. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha ulteriori domande sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Informi immediatamente il medico se le capita di avere uno qualsiasi dei seguenti sintomi dopo aver preso questo medicinale.

- Affanno improvviso, difficoltà di respirazione, gonfiore alle palpebre, al viso o alle labbra, eruzione cutanea o prurito (in particolare su tutto il corpo) poiché questo può essere il segno di una reazione di ipersensibilità.
- Dolore al petto e senso di costrizione che possono essere intensi e interessare la gola. Questi possono essere i sintomi di problemi circolatori cardiaci (ischemia cardiaca).
- Segni e sintomi di sindrome serotoninergica che possono includere agitazione, allucinazioni, perdita di coordinazione, aumento del battito cardiaco, aumento della temperatura corporea, cambi repentini della pressione sanguigna e riflessi iperattivi.

Altri effetti indesiderati che possono verificarsi:

Comune

(può interessare fino a 1 persona su 10)

- Dolore al petto o senso di costrizione o pressione, palpitazioni, aumento della frequenza cardiaca
- Capogiri, sensazione di rotazione del proprio corpo o degli oggetti (vertigini), mal di testa, sonnolenza, ridotta sensibilità al tatto e al dolore
- Mal di gola, senso di costrizione alla gola, secchezza della bocca
- Dolore addominale e allo stomaco, indigestione (disturbi allo stomaco), nausea (sensazione di disagio e malessere allo stomaco o all'addome con impulso al vomito)
- Rigidità (aumentato tono muscolare), debolezza muscolare, dolore alla schiena, dolore muscolare
- Sensazione generale di debolezza, sensazione di caldo, brividi, naso che cola, sudorazione, formicolio o sensazioni anomale, vampate, dolore.

Non comune

(può interessare fino a 1 persona su 100)

- Respirazione difficoltosa, sbadigli
- Gonfiore al viso, alle mani o ai piedi, infiammazione o infezione della lingua, eruzione cutanea, prurito
- Aumentata sensibilità al tatto o al dolore (iperestesia), perdita della coordinazione, movimenti ridotti o lenti, tremore, linguaggio confuso
- Non sentirsi sé stesso (depersonalizzazione), depressione, pensieri alterati, agitazione, confusione, cambiamento d'umore (euforia), periodi di non responsività (stupore), sensazione generale di disagio, malattia o mancanza di benessere (malessere), mancanza di sonno (insonnia)

Eletriptan Viatris 20 mg compresse rivestite con film
Eletriptan Viatris 40 mg compresse rivestite con film

- Perdita di appetito e di peso (anoressia), alterazione del gusto, sete
- Degenerazione delle articolazioni (artrosi), dolore alle ossa, dolore alle articolazioni
- Aumentata necessità di urinare, problemi di minzione, eccessiva minzione, diarrea
- Alterazione della vista, dolore oculare, intolleranza alla luce, occhi secchi o lacrimanti
- Dolore alle orecchie, ronzio alle orecchie (tinnito)
- Diminuzione della circolazione (disturbi alla circolazione periferica)

Raro

(può interessare fino a 1 persona su 1.000)

- Shock, asma, orticaria, disturbi della cute, edema della lingua
- Infezione della gola o del torace, gonfiore delle ghiandole linfatiche
- Battito cardiaco rallentato
- Instabilità emotiva (cambiamenti d'umore)
- Degenerazione delle articolazioni (artrite), disturbi muscolari, contrazioni muscolari
- Costipazione, infiammazione dell'esofago, eruttazione
- Dolore al petto, periodi mestruali intensi o prolungati
- Infezioni agli occhi (congiuntivite)
- Alterazione della voce

Altri effetti indesiderati riportati includono svenimento, elevata pressione sanguigna, infiammazione del colon, vomito, accidenti correlati al cervello e ai vasi sanguigni, insufficiente afflusso di sangue al cuore, attacco cardiaco, spasmi alle arterie o al muscolo cardiaco.

Il medico può richiederle anche regolari analisi del sangue per controllare l'eventuale aumento degli enzimi epatici o altri problemi del sangue.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Eletriptan Viatris

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Blister in PVC/Aclar/Alluminio: Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Eletriptan Viatris

Il principio attivo è eletriptan (come eletriptan bromidrato).

Ogni compressa rivestita con film di Eletriptan Viatris da 20 mg contiene 20 mg di eletriptan (come eletriptan bromidrato).

Eletriptan Viatriis 20 mg compresse rivestite con film
Eletriptan Viatriis 40 mg compresse rivestite con film

Ogni compressa rivestita con film di Eletriptan Viatriis da 40 mg contiene 40 mg di eletriptan (come eletriptan bromidrato).

Gli altri componenti sono: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, titanio diossido (E171), ipromellosa, glicerolo triacetato e giallo tramonto FCF lacca di alluminio (E110) (vedere il paragrafo 2 Eletriptan Viatriis contiene lattosio, il colorante giallo tramonto lacca di alluminio (E 110), e sodio).

Descrizione dell'aspetto di Eletriptan Viatriis e contenuto della confezione

Le compresse rivestite con film di Eletriptan Viatriis sono di colore arancione e forma rotonda.

Eletriptan Viatriis 20 mg compresse rivestite con film sono marcate con "Pfizer" su un lato e con "REP 20" sull'altro lato.

Eletriptan Viatriis 40 mg compresse rivestite con film sono marcate con "Pfizer" su un lato e con "REP 40" sull'altro lato.

Eletriptan Viatriis è disponibile in blister di PVC opaco /Aclar/Alluminio in confezioni da 2, 3, 4, 5, 6, 10, 18, 30 e 100 compresse.

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Viatriis Pharma S.r.l.
Via Vittor Pisani 20
20124 Milano

Produttore responsabile del rilascio lotti

R-Pharm Germany GmbH
Heinrich-Mack-Str. 35,
89257 Illertissen
Germania

oppure

Pfizer Italia S.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno
Italia

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito (Irlanda del Nord) con le seguenti denominazioni:

Paese	Denominazione del medicinale
Cipro	Eletriptan/Upjohn
Grecia	Eletriptan/Upjohn
Francia	Eletriptan Viatriis 40mg, comprimé pelliculé
Italia	Eletriptan Viatriis
Malta	Eletriptan Upjohn 20 mg film-coated tablets Eletriptan Upjohn 40 mg film-coated tablets

Eletriptan Viatris 20 mg compresse rivestite con film
Eletriptan Viatris 40 mg compresse rivestite con film

Paesi Bassi	Eletriptan Viatris 20 mg, filmomhulde tabletten Eletriptan Viatris 40 mg, filmomhulde tabletten
Portogallo	Eletriptan Upjohn
Regno Unito (Irlanda del Nord)	Eletriptan 20 mg film-coated tablets Eletriptan 40 mg film-coated tablets

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 04/2022