

## **Foglio illustrativo: informazioni per il paziente**

### **Olanzapina Pensa 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg compresse Olanzapina**

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Cos'è OLANZAPINA PENZA e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere OLANZAPINA PENZA
3. Come prendere OLANZAPINA PENZA
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare OLANZAPINA PENZA
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Cos'è OLANZAPINA PENZA e a cosa serve**

Olanzapina fa parte di un gruppo di farmaci detti antipsicotici ed è usato per curare le seguenti condizioni:

- La schizofrenia, una malattia con sintomi come udire, vedere o provare cose che non esistono, convinzioni errate, sospettosità ingiustificata e ritiro sociale. Le persone che presentano questa malattia possono inoltre sentirsi depresse, ansiose o tese.
- L'episodio di mania da moderato a grave, caratterizzata da sintomi eccitazione o euforia.

Olanzapina ha dimostrato di prevenire il ripetersi di questi sintomi in pazienti con disturbo bipolare il cui episodio di mania ha risposto al trattamento con olanzapina.

#### **2. Cosa deve sapere prima di prendere OLANZAPINA PENZA**

##### **Non prenda OLANZAPINA PENZA:**

- se è allergico (ipersensibile) ad olanzapina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6). Una reazione allergica può manifestarsi con eruzione cutanea, prurito, gonfiore al viso, gonfiore alle labbra, respiro affannoso. Se le è accaduto questo, lo riferisca al medico.
- se le è stato diagnosticato in precedenza un problema agli occhi come certi tipi di glaucoma (aumentata pressione all'interno dell'occhio).

##### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere OLANZAPINA PENZA.

- Si rivolga al medico se lei o qualcuno nella sua famiglia ha una storia di coaguli di sangue, medicinali come questi sono stati associati con la formazione di coaguli di sangue.
- Medicinali di questo tipo possono provocare movimenti inusuali soprattutto del viso e della lingua. Se ciò accade dopo che le è stata somministrata olanzapina lo riferisca al medico.
- Molto raramente, medicinali di questo tipo causano un'associazione di febbre, respiro accelerato, sudorazione, rigidità muscolare e stato confusionale o sonnolenza. Se questo accade, consulti subito il medico.

- L'uso dell'olanzapina nei pazienti anziani con demenza non è raccomandato in quanto potrebbe causare seri effetti indesiderati.
- L'aumento di peso è stato osservato in pazienti che prendono Olanzapina. Lei e il medico dovete controllare il suo peso regolarmente. Se necessario, considerate di rivolgervi ad un dietologo o di aiutarvi con un programma di dieta.
- Valori alti nel sangue di zuccheri e di grassi (trigliceridi e colesterolo) sono stati osservati in pazienti che prendono Olanzapina. Il medico deve richiedere esami del sangue per controllare gli zuccheri e certi valori dei grassi presenti nel sangue prima che lei inizi a prendere Olanzapina e, regolarmente, durante il trattamento.

Se lei è affetto da una delle seguenti patologie lo comunichi al medico non appena possibile:

- Diabete
- Malattie del cuore
- Malattie del fegato o dei reni
- Malattia di Parkinson
- Problemi alla prostata
- Blocco intestinale (Ileo paralitico)
- Malattie del sangue
- Ictus o attacco ischemico transitorio (sintomi transitori di ictus)
- Convulsioni
- Se lei sa che può avere una eccessiva perdita di sale a causa di diarrea e vomito gravi e prolungati (essendo malato) o dell'uso di diuretici (compresse per urinare)

Se è affetto da demenza, lei o chi si prende cura di lei deve informare il medico nel caso in cui abbia avuto in passato un ictus o un attacco ischemico transitorio.

Come precauzione da seguire di routine, se ha più di 65 anni si faccia controllare periodicamente la pressione sanguigna dal medico.

### **Bambini e adolescenti**

Olanzapina non è indicato nei pazienti di età inferiore ai 18 anni.

### **Altri medicinali e OLANZAPINA Pensa**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

- Durante il trattamento con l'olanzapina assuma altri medicinali solo dopo l'autorizzazione del medico. Lei potrebbe sentirsi assonnato se olanzapina viene assunto in combinazione con antidepressivi o medicinali presi per l'ansia o per aiutarla a dormire (tranquillanti).

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale. In particolare, riferisca al medico se sta assumendo:

- Carbamazepina (un anti-epilettico e stabilizzante dell'umore), fluvoxamina (un antidepressivo), o ciprofloxacina (un antibiotico), poiché può essere necessario modificare la sua dose di olanzapina.
- medicinali per la malattia di Parkinson.

### **OLANZAPINA Pensa con alcol**

Non beva nessun tipo di alcolico durante il trattamento con OLANZAPINA Pensa poiché l'assunzione contemporanea di olanzapina ed alcool può provocarle sonnolenza.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza o se sta allattando con latte materno, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Non deve prendere questo medicinale durante l'allattamento al seno, poiché piccole quantità di olanzapina possono passare nel latte materno.

I seguenti sintomi si possono verificare nei neonati di madri che hanno usato olanzapina nell'ultimo trimestre (ultimi tre mesi di gravidanza): tremore, rigidità e/o debolezza muscolare, sonnolenza, agitazione, problemi respiratori e difficoltà di alimentazione. Se il suo bambino presenta uno di questi sintomi, può essere necessario contattare il medico.

### **Guida di veicoli ed utilizzo di macchinari**

Quando prende olanzapina c'è il rischio che possa andare incontro a sonnolenza. Se questo si verifica non guidi o non azioni strumenti o macchinari. Informi il medico.

### **OLANZAPINA PENZA contiene lattosio**

Questo medicinale contiene lattosio. Se il medico le ha riferito che lei ha una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

## **3. Come prendere OLANZAPINA PENZA**

- Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.
- Il medico le dirà quante compresse di olanzapina deve assumere e per quanto tempo deve continuare a prenderle. La dose raccomandata di olanzapina varia da 5 a 20 mg al giorno. Se i suoi sintomi ricompaiono ne parli con il medico ma non interrompa l'assunzione di olanzapina a meno che non sia il medico a dirglielo.
- Deve assumere le compresse di olanzapina una volta al giorno, seguendo le istruzioni del medico. Cerchi di prendere le compresse ogni giorno sempre alla stessa ora. Non ha importanza se le assume a stomaco pieno o a stomaco vuoto. OLANZAPINA PENZA è per uso orale. Deglutisca le compresse di olanzapina per intero, con acqua.

### **Se prende più OLANZAPINA PENZA di quanto deve**

I pazienti che hanno assunto più olanzapina di quello che avrebbero dovuto, hanno manifestato i seguenti sintomi: accelerazione del battito cardiaco, agitazione/aggressività, problemi nel linguaggio, movimenti inusuali (specialmente del viso o della lingua) e un ridotto livello di coscienza. Altri sintomi possono essere: confusione acuta, convulsioni (epilessia), coma, una combinazione di febbre, respiro accelerato, sudorazione, rigidità muscolare, sopore o sonnolenza, rallentamento della frequenza respiratoria, riduzione del riflesso della tosse, pressione sanguigna alta o bassa, alterazioni del ritmo cardiaco. Contatti immediatamente il medico o l'ospedale se si manifesta uno qualsiasi dei suddetti sintomi. Mostri al medico la sua confezione di compresse.

### **Se dimentica di prendere OLANZAPINA PENZA**

Prenda le compresse non appena se ne ricorda. Non prenda una dose doppia in un giorno.

### **Se interrompe il trattamento con OLANZAPINA PENZA**

Non smetta di prendere le compresse appena comincia a sentirsi meglio. È importante che lei continui la cura con olanzapina per tutto il tempo che il medico ritiene necessario. Se interrompe improvvisamente l'assunzione di olanzapina, potrebbero manifestarsi sintomi come sudorazione, incapacità a dormire, tremore, ansia o nausea e vomito. Il medico può consigliarle di ridurre gradualmente la dose prima di cessare il trattamento.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Riferisca immediatamente al medico se lei presenta:

- movimenti inusuali (un effetto indesiderato comune che può interessare fino a 1 persona su 10) soprattutto del viso o della lingua;
- coaguli di sangue nelle vene (un effetto indesiderato non comune che può interessare fino a 1 paziente su 100), specialmente agli arti inferiori (i sintomi includono gonfiore, dolore ed arrossamento della gamba), che possono circolare attraverso i vasi sanguigni fino ai polmoni causando la comparsa di dolore al petto e difficoltà di respirazione. Se riscontra qualcuno di questi sintomi, consulti immediatamente un medico;

- un'associazione di febbre, respiro accelerato, sudorazione, rigidità muscolare e stato confusionale o sonnolenza (la frequenza di questo effetto indesiderato non può essere stimata in base ai dati disponibili).

Effetti indesiderati molto comuni: possono interessare più di 1 persona su 10

- Aumento di peso.
- Sonnolenza.
- Aumenti dei livelli di prolattina nel sangue.

Nelle fasi iniziali del trattamento, alcune persone possono avvertire una sensazione di capogiro o svenimento (con un rallentamento del battito cardiaco), specialmente alzandosi in piedi da una posizione sdraiata o seduta. Questi sintomi di solito regrediscono spontaneamente, ma se questo non accade informi il medico.

Effetti indesiderati comuni: possono interessare fino a 1 persona su 10

- Alterazioni dei livelli di alcune cellule del sangue e dei grassi circolanti e nelle fasi iniziali del trattamento aumenti temporanei degli enzimi del fegato.
- Aumenti del livello di zuccheri nel sangue e nelle urine.
- Aumenti dei livelli di acido urico e di creatinfosfochinasi nel sangue
- Sensazione di aumento della fame.
- Capogiro.
- Irrequietezza.
- Tremore
- Movimenti inusuali (discinesie)
- Stitichezza.
- Secchezza della bocca.
- Eruzione cutanea.
- Perdita di forza.
- Estrema stanchezza.
- Ritenzione idrica che porta ad un rigonfiamento delle mani, delle anche o dei piedi.
- Febbre
- Dolori articolari
- Disfunzioni sessuali, come diminuzione della libido nei maschi e nelle femmine o disfunzione erettile nei maschi.

Effetti indesiderati non comuni: possono interessare fino a 1 persona su 100

- ipersensibilità (ad esempio gonfiore alla bocca e alla gola, prurito, eruzione cutanea);
- diabete o peggioramento del diabete, occasionalmente associato a chetoacidosi (presenza di corpi chetonici nel sangue e nell'urina) o coma;
- crisi epilettiche, abitualmente associate a una storia di crisi epilettiche (epilessia);
- rigidità o spasmi muscolari (inclusi i movimenti dell'occhio);
- sindrome delle gambe senza riposo;
- problemi nel linguaggio; balbuzie
- rallentamento del battito cardiaco;
- sensibilità alla luce solare;
- sanguinamento dal naso;
- gonfiore addominale;
- sbavamento;
- perdita della memoria o dimenticanza;
- incontinenza urinaria;
- mancanza della capacità di urinare;
- perdita dei capelli;
- assenza o riduzione dei cicli mestruali;
- alterazioni a carico delle mammelle nei maschi e nelle femmine, come crescita anomala o secrezione anomala di latte.

Effetti indesiderati rari: possono interessare fino a 1 persona su 1000

- Diminuzione della temperatura corporea.
- Alterazioni del ritmo del cuore.

- Morte improvvisa inspiegata.
- Infiammazione del pancreas che causa forte dolore allo stomaco, febbre e malessere.
- Malattia del fegato che si manifesta come ingiallimento della cute e delle parti bianche degli occhi.
- Malattia muscolare che si presenta come dolorabilità e dolori immotivati.
- Erezione prolungata e/o dolorosa.

Effetti indesiderati molto rari includono reazioni allergiche gravi come la reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (Sindrome DRESS). La DRESS si manifesta inizialmente con una sintomatologia simili-influenzale, con una eruzione cutanea sul viso che successivamente diviene estesa, alta temperatura corporea, ingrossamento dei linfonodi, aumento dei livelli degli enzimi epatici osservato sugli esami del sangue ed aumento di un tipo di globuli bianchi (aumento degli eosinofili).

Durante il trattamento con olanzapina, pazienti anziani con demenza potrebbero essere soggetti a ictus, polmonite, incontinenza urinaria, cadute, estrema stanchezza, allucinazioni visive, un rialzo della temperatura corporea, arrossamento della cute, disturbi della deambulazione. In questo particolare gruppo di pazienti sono stati riportati alcuni casi fatali.-

In pazienti con malattia di Parkinson olanzapina può determinare un peggioramento dei sintomi.

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse](http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse). Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare OLANZAPINA PENZA**

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non prenda olanzapina dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo SCAD. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare nella confezione originale.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione ed altre informazioni**

### **Cosa contiene OLANZAPINA PENZA**

- Il principio attivo è olanzapina. Ogni compressa contiene 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg di olanzapina.

- Gli altri componenti sono: cellulosa microcristallina, lattosio anidro, crospovidone, magnesio stearato

### **Descrizione dell'aspetto di OLANZAPINA PENZA e contenuto della confezione**

Olanzapina Pensa è disponibile in compresse.

Descrizione:

Le compresse di OLANZAPINA PENZA 2,5 mg sono gialle, cilindriche e biconvesse con logo Y2.

Le compresse di OLANZAPINA PENZA 5 mg sono gialle, cilindriche e biconvesse con logo Y5.

Le compresse di OLANZAPINA PENZA 7,5 mg sono gialle, cilindriche e biconvesse con logo Y7.

Le compresse di OLANZAPINA PENZA 10 mg sono gialle, cilindriche e biconvesse con logo Y10.

Le compresse di OLANZAPINA PENZA 15 mg sono gialle, cilindriche e biconvesse.

Le compresse di OLANZAPINA PENZA 20 mg sono gialle, ovali e biconvesse.

Le compresse di OLANZAPINA PENZA sono disponibili in confezioni da 28 e 56 compresse.

### **Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio e produttore**

*Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:*

Pensa Pharma S.p.A.

Via Ippolito Rosellini, 12

20124 Milano

Italia

*Produttore:*

Laboratorios Cinfa, S.A.

C/ Olaz-Chipi, 10 – Polígono Industrial Areta

31620 Huarte-Pamplona (Navarra)

Spagna

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: Luglio 2021**