




Codice QR che collega all'indirizzo URL: www.oeh.fi/bfit

Scansionare questo codice o visitare www.oeh.fi/bfit per vedere le istruzioni su come usare l'Easyhaler

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Fobuler, 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione Budesonide/formoterolo fumarato diidrato

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Fobuler 160 mcg/4,5 mcg e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Fobuler 160 mcg/4,5 mcg
3. Come usare Fobuler 160 mcg/4,5mcg
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Fobuler 160 mcg/4,5 mcg
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Fobuler 160 mcg/4,5 mcg e a che cosa serve

Fobuler è costituito da un inalatore che è utilizzato per il trattamento dell'asma negli adulti e adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni. E' inoltre utilizzato per il trattamento dei sintomi della Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) negli adulti dai 18 anni in su. Contiene due medicinali diversi: budesonide e formoterolofumarato diidrato.

- Budesonide appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati "corticosteroidi". Agisce riducendo e prevenendo il gonfiore e l'infiammazione nei polmoni.

- Formoterolo fumarato diidrato appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati “beta₂-adrenocettori agonisti a lunga durata d’azione” o “broncodilatatori”. Agisce rilassando i muscoli delle vie respiratorie, facilitando così la respirazione.

Asma

Fobuler 160 mcg/4,5 mcg può essere prescritto per l’asma in due modi diversi.

a) Ad alcune persone vengono prescritti due inalatori per l’asma: Fobuler 160 mcg/4,5 mcg e un “inalatore da usare al bisogno” separato.

- Usano Fobuler ogni giorno. Questo aiuta a prevenire la comparsa dei sintomi asmatici.
- Usano l’ “inalatore da usare al bisogno” quando presentano i sintomi asmatici, per facilitare la ripresa della respirazione.

b) Ad alcune persone viene prescritto Fobuler 160 mcg/4,5 mcg come unico inalatore per l’asma.

- Usano Fobuler ogni giorno. Questo aiuta a prevenire la comparsa dei sintomi asmatici.
- Usano Fobuler anche quando necessitano di dosi supplementari per il sollievo dei sintomi asmatici, per facilitare la ripresa della respirazione e, se concordato con il medico, anche per prevenire l’insorgenza dei sintomi dell’asma (ad esempio, durante l’esercizio fisico o in caso di esposizione ad allergeni). Non necessitano di un inalatore separato per tale scopo.

Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

Fobuler 160 mcg/4,5 mcg può essere utilizzato anche per trattare i sintomi della BPCO negli adulti. La BPCO è una malattia cronica delle vie respiratorie polmonari, spesso causata dal fumo di sigarette.

2 Cosa deve sapere prima di usare Fobuler 160 mcg/4,5 mcg

Non usi Fobuler 160 mcg/4,5 mcg:

- se è allergico a budesonide, formoterolo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6) che è il lattosio (che contiene piccole quantità di proteine del latte).

Avvertenze e Precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Fobuler se:

- È diabetico.
- Ha un’infezione polmonare.
- Ha la pressione alta o se ha mai avuto in passato problemi al cuore (inclusi battito cardiaco irregolare, polso molto accelerato, restringimento delle arterie o insufficienza cardiaca).
- Ha problemi alla tiroide o alle ghiandole surrenali.
- Ha bassi livelli di potassio nel sangue.
- Ha problemi gravi al fegato.

Contatti il medico se si presentano visione offuscata o altri disturbi visivi.

Sciacqui la bocca dopo aver inalato la dose in modo da evitare un’infezione fungina alla bocca.

Altri medicinali e Fobuler

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

Alcuni medicinali possono aumentare gli effetti di Fobuler e il medico controllerà attentamente se sta assumendo questi medicinali (inclusi alcuni medicinali per l’HIV: ritonavir, cobicistat).

In particolare, informi il medico o il farmacista se sta assumendo uno dei seguenti medicinali:

- Medicinali betabloccanti (quali atenololo o propranololo per la pressione alta), incluse le gocce oculari (quali timololo per il glaucoma).
- Medicinali per il battito cardiaco accelerato o irregolare (quali chinidina).
- Medicinali quali digossina, spesso usata per trattare l’insufficienza cardiaca.

- Diuretici, noti anche come “compresse di acqua” (quali furosemide), usati per il trattamento della pressione alta.
- Medicinali steroidei assunti per bocca (quali prednisolone).
- Medicinali xantini (quali teofillina o aminofillina), spesso usati per il trattamento dell’asma.
- Altri broncodilatatori (quali salbutamolo).
- Antidepressivi triciclici (quali amitriptilina) e l’antidepressivo nefazodone.
- Medicinali fenotiazinici (quali clorpromazina e proclorperazina).
- Medicinali per trattare infezioni (quali ketoconazolo, itraconazolo, voriconazolo, posaconazolo, claritromicina e telitromicina).
- Medicinali per il morbo di Parkinson (quali levodopa).
- Medicinali per problemi alla tiroide (quali levotiroxina).

Se rientra in uno dei casi sopra citati, o in caso di dubbio, consulti il medico o il farmacista prima di usare Fobuler.

Informi il medico o il farmacista anche se deve sottoporsi ad un’anestesia generale per un intervento chirurgico o odontoiatrico.

Gravidanza e allattamento

- Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.
- Non prenda Fobuler se non su indicazione del medico.
- Se inizia una gravidanza durante il trattamento con Fobuler, non interrompa l’uso di Fobuler ma consulti immediatamente il medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Fobuler non ha alcun effetto o ha un effetto trascurabile sulla capacità di guidare o usare strumenti o macchinari.

Fobuler contiene lattosio, che è un tipo di zucchero. Se il suo medico le ha detto che ha un’intolleranza ad alcuni zuccheri, consulti il medico prima di usare questo medicinale. La quantità di lattosio contenuta in questo medicinale di norma non causa problemi nelle persone intolleranti al lattosio. L’eccipiente lattosio contiene piccole quantità di proteine del latte che possono causare reazioni allergiche.

Per chi svolge attività sportiva

L’uso del medicinale senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping.

3 Come usare Fobuler 160 mcg/4,5 mcg

- Usi sempre questo medicinale seguendo esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.
- È importante usare Fobuler ogni giorno, anche se non ha sintomi di asma o di BPCO al momento.
- Se usa Fobuler per l’asma, il suo medico vorrà controllare periodicamente i sintomi.

Se ha preso steroidi in compresse per la sua asma o BPCO, il suo medico può ridurre il numero di compresse che sta assumendo, una volta che ha iniziato ad usare Fobuler. Se ha preso steroidi in compresse per un lungo periodo, il suo medico può richiedere di effettuare esami del sangue periodicamente. Quando riduce il numero di steroidi orali lei può avvertire una sensazione di malessere generalizzato nonostante i suoi sintomi respiratori possano risultare migliorati. Potrebbe provare sintomi come naso chiuso e naso che cola, debolezza o dolore muscolare o alle articolazioni ed eruzione cutanea (eczema). Se uno qualsiasi di questi sintomi la preoccupano o se si verificano sintomi come cefalea, stanchezza, nausea (sensazione di malessere) o vomito (malessere) contatti immediatamente il suo medico. Può aver bisogno di prendere un altro medicinale in caso di sintomi allergici o artritici. Chieda al suo medico nel caso abbia dubbi sul continuare o meno la terapia con Fobuler.

Il suo medico può considerare l'aggiunta di steroidi in compresse al suo trattamento usuale durante periodi di stress (per esempio quando ha un'infezione respiratoria o prima di un intervento chirurgico).

Informazioni importanti sui sintomi dell'asma o della BPCO

Se nota la comparsa di affanno o sibilo respiratorio mentre usa Fobuler, deve continuare a usarlo ma consulti il medico non appena possibile in quanto potrebbe essere necessario un trattamento supplementare.

Contatti immediatamente il suo medico se:

- La respirazione peggiora o se si sveglia spesso di notte a causa dell'asma.
- Inizia ad avvertire oppressione al torace alla mattina o se l'oppressione al torace dura più a lungo del solito. Questi segni potrebbero significare che l'asma o la BPCO non è correttamente controllato e che potrebbe essere necessario immediatamente un trattamento diverso o supplementare.

ASMA

Fobuler 160 mcg/4,5 mcg può essere prescritto per l'asma in due modi diversi. La quantità di Fobuler da utilizzare e quando utilizzarla dipende dalla prescrizione del medico.

- a) Se le è stato prescritto Fobuler e un inalatore da usare al bisogno separato, legga il paragrafo "A) Uso di Fobuler e di un inalatore da usare al bisogno separato".
- b) Se le è stato prescritto Fobuler come unico inalatore, legga il paragrafo "B) Uso di Fobuler come unico inalatore per l'asma".

A) Uso di Fobuler e di un inalatore da usare al bisogno separato

Usi Fobuler ogni giorno. Ciò aiuta a prevenire la comparsa dei sintomi asmatici.

Adulti (18 anni e oltre)

- La dose abituale è 1 o 2 inalazioni, due volte al giorno.
- Il medico potrà aumentare questa dose a 4 inalazioni, due volte al giorno.
- Se i sintomi sono ben controllati il suo medico potrà richiederle di prendere il medicinale una volta al giorno.

Adolescenti (12-17 anni)

- La dose abituale è 1 o 2 inalazioni, due volte al giorno.
- Se i sintomi sono ben controllati il suo medico potrà richiederle di prendere il medicinale una volta al giorno.

Un dosaggio inferiore di Fobuler è disponibile per i bambini dai 6 agli 11 anni di età.

L'uso di Fobuler non è raccomandato ai bambini di età inferiore ai 6 anni.

Il medico (o l'infermiere) la aiuterà nella gestione dell'asma e aggiusterà la dose di questo medicinale a quella più bassa che controlla l'asma. Comunque non modifichi la dose senza parlarne prima con il suo medico (o l'infermiere).

Usi l'"inalatore da usare al bisogno" separato per trattare i sintomi asmatici quando compaiono. Tenga sempre con sé l'"inalatore da usare al bisogno", per poterlo usare quando è necessario. Non usi Fobuler per trattare i sintomi asmatici, ma l'inalatore da usare al bisogno.

B) Uso di Fobuler come unico inalatore per l'asma

Usi Fobuler in questo modo solo su indicazione del medico e se ha più di 12 anni di età.

Usi Fobuler 160 mcg/4,5 mcg ogni giorno. Ciò aiuta a prevenire la comparsa dei sintomi asmatici. Può assumere:

- 1 inalazione al mattino e 1 inalazione alla sera

oppure

- 2 inalazioni al mattino

oppure

- 2 inalazioni alla sera.

Il medico può aumentare questa dose a 2 inalazioni due volte al giorno.

Usi inoltre Fobuler 160 mcg/4,5 mcg come “inalatore da usare al bisogno” per trattare i sintomi asmatici quando compaiono e per prevenire l’insorgenza dei sintomi dell’asma (ad esempio, durante l’esercizio fisico o in caso di esposizione ad allergeni).

- Se compaiono i sintomi asmatici, assumi 1 inalazione e attendi qualche minuto.
- Se non si sente meglio, assumi un’altra inalazione.
- Non assumi più di 6 inalazioni in un’unica volta.

Tenga sempre con sé Fobuler, per usarlo quando è necessario.

Di norma non è necessaria una dose giornaliera totale superiore a 8 inalazioni. Tuttavia, il medico potrà consentirle di assumere fino a 12 inalazioni al giorno per un periodo limitato.

Se deve usare regolarmente 8 o più inalazioni al giorno, consulti il medico o l’infermiere perché potrebbe essere necessario modificare il trattamento.

Non usi più di 12 inalazioni in totale in 24 ore.

Se compaiono i sintomi asmatici mentre fa esercizio fisico, usi Fobuler come descritto in questo foglio. È importante discutere con il proprio medico l’uso di Fobuler per prevenire l’insorgenza dei sintomi dell’asma; il trattamento che le è stato prescritto potrebbe essere influenzato da quanto spesso svolge l’esercizio fisico o da quanto spesso è esposto agli allergeni.

BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva)

- Solo per utilizzo negli adulti (18 anni e oltre).
- La dose abituale è 1 inalazione due volte al giorno.

Il medico può anche prescrivere altri farmaci broncodilatatori, per esempio anticolinergici (come tiotropio o ipratropio bromuro) per la BPCO.

Se usa più Fobuler di quanto deve

È importante che lei assuma la dose come indicato sull’etichetta o come consigliato dal suo medico.

Non deve superare la dose prescritta senza consultare il proprio medico di fiducia.

I sintomi più comuni che si possono verificare se si usa più Fobuler 160 mcg/4,5 mcg di quanto si deve sono: tremore, mal di testa o accelerazione del battito cardiaco.

Se dimentica di usare Fobuler

- Se dimentica di prendere una dose, la prenda non appena se ne ricorda. Tuttavia, se è quasi l’ora della dose successiva, salti la dose dimenticata.
- **Non** prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza di una dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

Le istruzioni su come usare l’inalatore sono alla fine del foglio.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se si verifica uno dei seguenti casi, interrompa l'uso di Fobuler e contatti immediatamente il medico:

- Gonfiore del viso, in particolare intorno alla bocca (lingua e/o gola e/o difficoltà nella deglutizione) o orticaria accompagnata da difficoltà di respirazione (angioedema) e/o improvvisa sensazione di svenimento, che potrebbe indicare una reazione allergica. Questo effetto si verifica raramente e riguarda fino a 1 persona su 1.000.
- Improvviso respiro sibilante e più corto immediatamente dopo l'uso del suo inalatore. **Se si verifica uno di questi sintomi bisogna smettere di usare Fobuler immediatamente e usare il proprio inalatore "al bisogno". Contatti immediatamente il suo medico se avesse bisogno di cambiare il trattamento.** Ciò si verifica molto raramente, interessando fino a 1 persona su 10.000.

Informi il medico se ha uno qualsiasi dei seguenti sintomi mentre prende Fobuler, potrebbero essere sintomi di una infezione polmonare:

- Febbre o brividi.
- Aumento della produzione di muco, cambiamenti di colore del muco.
- Aumento della tosse o maggiori difficoltà respiratorie.

Polmonite (infezione del polmone), in pazienti con BPCO è un effetto collaterale comune (può interessare fino a 1 persona su 10)

Altri possibili effetti indesiderati:

Comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10)

- Palpitazioni (consapevolezza del battito del cuore), tremore o agitazione. Se questi effetti si verificano, di solito sono lievi e scompaiono continuando il trattamento con Fobuler.
- Mughetto (un'infezione fungina) nella bocca. Ciò è meno probabile se si risciacqua la bocca con acqua dopo aver usato Fobuler.
- Lieve mal di gola, tosse e raucedine.
- Mal di testa.

Non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100)

- Sensazione di irrequietezza, nervosismo o agitazione.
- Sonno disturbato.
- Vertigini.
- Nausea (malessere).
- Battito cardiaco accelerato.
- Ecchimosi alla cute.
- Crampi muscolari.
- Visione offuscata

Rari (possono interessare fino a 1 persona su 1.000)

- Eruzione cutanea, prurito.
- Broncospasmo (restringimento dei muscoli nelle vie respiratorie che causa sibilo). Se si verifica sibilo respiratorio subito dopo aver usato Fobuler, interrompa l'uso di Fobuler e contatti immediatamente il medico.
- Bassi livelli di potassio nel sangue.
- Battito cardiaco irregolare.

Molto rari (possono interessare fino a 1 persona su 10.000)

- Depressione.
- Cambiamenti del comportamento, soprattutto nei bambini.
- Dolore o oppressione al torace (angina pectoris).
- Aumento della quantità di zucchero (glucosio) nel sangue.
- Alterazioni del gusto, ad esempio sapore sgradevole in bocca.
- Variazioni della pressione sanguigna.

I corticosteroidi per via inalatoria possono influire sulla normale produzione di ormoni steroidei nell'organismo, in particolare se si usano dosi elevate per un periodo prolungato. Questi effetti comprendono:

- Alterazioni della densità minerale ossea (assottigliamento delle ossa).
- Cataratta (opacità del cristallino nell'occhio).
- Glaucoma (aumento della pressione nell'occhio).
- Rallentamento della crescita nei bambini e negli adolescenti.
- Effetto sulla ghiandola surrenale (una piccola ghiandola vicino al rene).

La comparsa di questi effetti è molto meno probabile con i corticosteroidi assunti per via inalatoria che con i corticosteroidi in compresse.

Segnalazione di effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Fobuler 160 mcg/4,5 mcg

- Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
- Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola, il sacchetto di alluminio o sull'etichetta dell'inalatore dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.
- Dopo l'apertura del sacchetto di alluminio conservare ad una temperatura non superiore a 25°C e proteggere dall'umidità. Si raccomanda di tenere l'Easyhaler nella sua custodia protettiva.
- Se il suo Fobuler si inumidisce, è necessario sostituirlo con uno nuovo.
- Sostituire Fobuler 4 mesi dopo aver aperto il sacchetto di alluminio. Annotare la data di apertura del sacchetto per aiutarla a ricordare.
- Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Fobuler 160 mcg/4,5 mcg

- I principi attivi sono budesonide e formoterolo fumarato diidrato. Ogni dose inalata contiene 160 microgrammi di budesonide e 4,5 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato.
- L'eccipiente è lattosio monoidrato (che contiene proteine del latte).

Descrizione dell'aspetto di Fobuler 160 mcg/4,5 mcg e contenuto della confezione

Fobuler 160 mcg/4,5 mcg è costituito da un inalatore easyhaler che contiene il medicinale. La polvere per inalazione è di colore bianco-giallastro. Ogni inalatore contiene 60 dosi ed ha un corpo bianco ed una parte superiore rossa.

Fobuler 160 mcg/4,5 mcg è disponibile in confezioni da 1 o 3 inalatori, 120 dosi anche in confezioni da 2 inalatori.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

La sua confezione può contenere una custodia di protezione. In caso vi necessiti un coperchio protettivo, si prega di contattare il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (dettagli di seguito).

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finlandia

Concessionario di vendita

Farmaceutici Caber S.r.l
Via del Mare, 36 Pomezia
(RM)

Produttore

Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finlandia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 08/2020

Informazioni dettagliate e aggiornate su come usare questo prodotto sono disponibili mediante la scansione di questo codice QR (incluso anche sulla scatola e sull'etichetta dell'inalatore) con uno smartphone. Le stesse informazioni sono disponibili anche sul seguente indirizzo URL: www.oeh.fi/bfit

Codice QR che collega all'indirizzo URL: www.oeh.fi/bfit

Come usare l'inalatore Easyhaler**Informazioni su Easyhaler**

Fobuler può essere diverso dagli inalatori che lei ha usato in passato. Pertanto è molto importante che lo usi correttamente poiché l'uso scorretto può comportare il mancato ricevimento della giusta quantità di medicinale. Questo può farla stare molto male o può comportare che l'asma e la BPCO non vengano trattati correttamente.

Il medico, l'infermiere o il farmacista le mostreranno come utilizzare correttamente l'inalatore. Si assicuri di aver compreso il modo corretto di usare l'inalatore. In caso di dubbi, contattare il medico, l'infermiere o il farmacista. Come per tutti gli inalatori, chi si prende cura dei bambini deve assicurarsi che i bambini ai quali venga prescritto Fobiuler usino la tecnica corretta per l'inalazione, come descritto di seguito. È inoltre possibile utilizzare il video di istruzioni disponibile all'indirizzo www.oeh.fi/bfit

Primo utilizzo dell'Easyhaler

L'Easyhaler è fornito in un sacchetto di alluminio. Non aprire il sacchetto di alluminio finché non si è pronti per iniziare ad usare il medicinale perché aiuta a mantenere la polvere asciutta nell'inalatore.


Quando si è pronti per iniziare il trattamento, aprire il sacchetto e segnare la data, ad esempio sul suo calendario.

Utilizzare l'inalatore entro 4 mesi dalla apertura della sacca di alluminio.



CORRETTO UTILIZZO

Step 1: AGITARE • Rimuovere il copri bocaglio • Agitare l'inalatore da 3 a 5 volte tenendolo in posizione verticale	AGITARE x 3-5 	Punti importanti da ricordare • È importante mantenere l'inalatore in posizione verticale • Se si preme accidentalmente mentre si agita l'inalatore, svuotare la polvere dal bocaglio come mostrato di seguito
--	--	---


Step 2: PREMERE • Continuare a tenere l'inalatore in posizione verticale tra l'indice e il pollice • Premere verso il basso fino a quando non si sente uno scatto e lasciare che l'inalatore faccia nuovamente uno scatto. Questo rilascia una dose • Premere una volta sola verso il basso	PREMERE x 1 	Punti importanti da ricordare • L'inalatore non scatta se il copri bocaglio è ancora inserito • Premere una sola volta verso il basso • Se si preme accidentalmente più di una volta, svuotare la polvere dal bocaglio, come mostrato di seguito • Premere per rilasciare la dose prima di inalare, non premere ed inalare allo stesso tempo • Mantenere l'inalatore in posizione verticale mentre si preme e mentre si inala la dose. Se si capovolge, la polvere potrebbe fuoriuscire prima di essere inalata.
--	---	---

Step 3: INALARE • Continuare a tenere l'inalatore in posizione verticale • Espirare normalmente • Mettere il bocaglio in bocca tra i denti e chiudere strettamente le labbra attorno al bocaglio • Inspirare energicamente e profondamente • Togliere l'inalatore dalla bocca, quindi espirare normalmente.	INALARE 	Punti importanti da ricordare • Assicurarsi che tutto il bocaglio sia ben inserito nella bocca, in modo che il farmaco entri nei polmoni • Assicurarsi che le labbra si stringano bene attorno al bocaglio • Non espirare nell'inalatore. Questo è importante: potrebbe intasare l'inalatore. Se si esira nell'inalatore, svuotare la polvere dal bocaglio, come mostrato di seguito
---	---	--

Se deve fare un'altra inalazione, ripeta i passaggi 1-3 Agitare-Premere-Inalare.

Dopo aver usato l'inalatore:

- Rimettere il copri bocaglio sul bocaglio. Questo evita che l'inalatore possa attivarsi accidentalmente.
- Dopo aver preso la dose, sciacquare la bocca con acqua e sputarla.

Come svuotare la polvere dal bocaglio Se si preme l'inalatore accidentalmente o è stato premuto più di una volta o se si è espirato in esso, svuotare il bocaglio. • Battere il bocaglio sul tavolo o sul palmo della mano per far uscire la polvere. • Ricominciare quindi con i passaggi Agitare-Premere-Inalare.	
---	--

Pulizia dell'Easyhaler

Tenere l'inalatore asciutto e pulito. Se necessario, è possibile pulire il bocaglio dell' inalatore con un panno o un tessuto asciutto. Non usare acqua: la polvere nell'Easyhaler è sensibile all'umidità.

Utilizzo dell' Easyhaler con una custodia di protezione

È possibile utilizzare una custodia di protezione con l'inalatore. Questo aiuta a migliorare la durata del prodotto. Quando si inserisce per la prima volta l'inalatore nella custodia di protezione, assicurarsi che il copri boccaglio si trovi sull'inalatore, poiché ciò evita che l'inalazione possa attivarsi accidentalmente. È possibile utilizzare l'inalatore senza rimuoverlo dalla custodia di protezione.

Seguire le stesse istruzioni riportate sopra, **1. Agitare - 2. Premere - 3. Inalare.**

Ricordarsi di:

- Tenere l'inalatore in posizione verticale quando si preme
- Chiudere il copriboccaglio dopo l'assunzione della dose poiché ciò evita che l'inalatore possa attivarsi accidentalmente.



Quando passare a un nuovo Easyhaler

Il conta dosi mostra il numero di dosi rimanenti. Il conta dosi gira dopo ogni 5 erogazioni. Quando il conta dosi inizia a diventare rosso, ci sono ancora 20 dosi da erogare.

Se non si ha già un nuovo Easyhaler, contattare il proprio medico per una nuova prescrizione. Quando il conta dosi raggiunge lo 0 (zero), è necessario sostituire l'Easyhaler.

Se si usa la custodia protettiva, conservarla ed inserire il nuovo inalatore in essa.



Ricordare

- **1. Agitare – 2. Premere – 3. Inalare.**
- Dopo aver preso la dose, sciacquare la bocca con acqua e sputarla.
- Non bagnare l'inalatore, proteggerlo dall'umidità

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.