

ARIPIPRAZOLO EG 5 mg compresse
ARIPIPRAZOLO EG 10 mg compresse
ARIPIPRAZOLO EG 15 mg compresse

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

ARIPIPRAZOLO EG 5 mg compresse
ARIPIPRAZOLO EG 10 mg compresse
ARIPIPRAZOLO EG 15 mg compresse

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio

1. Cos'è ARIPIPRAZOLO EG e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere ARIPIPRAZOLO EG
3. Come prendere ARIPIPRAZOLO EG
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare ARIPIPRAZOLO EG
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è ARIPIPRAZOLO EG e a cosa serve

ARIPIPRAZOLO EG contiene il principio attivo aripiprazolo e appartiene a un gruppo di medicinali chiamati antipsicotici. Si usa per il trattamento di adulti ed adolescenti a partire da 15 anni di età che sono affetti da una malattia caratterizzata da sintomi come udire, vedere o percepire cose che non siano presenti, sospettosità, convinzioni erranee, discorsi e comportamenti incoerenti e appiattimento delle emozioni. Le persone che presentano questa condizione possono inoltre sentirsi depresse, colpevoli, ansiose o tese.

ARIPIPRAZOLO EG si usa per il trattamento di adulti e adolescenti a partire da 13 anni di età che sono affetti da una condizione caratterizzata da sintomi come sentirsi “su di giri”, avere eccessiva energia, non aver bisogno di dormire rispetto al solito, parlare molto velocemente con “fuga delle idee” e talvolta grave irritabilità. Inoltre, previene la recidiva di questa condizione negli adulti che hanno risposto al trattamento con ARIPIPRAZOLO EG.

2. Cosa deve sapere prima di prendere ARIPIPRAZOLO EG

NON prenda ARIPIPRAZOLO EG

- se è allergico all'aripiprazolo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico prima di prendere ARIPIPRAZOLO EG.

Durante il trattamento con aripiprazolo sono stati segnalati pensieri e comportamenti suicidari. Informi immediatamente il medico se sta avendo qualsiasi pensiero o sensazione autolesionista.

ARIPIRAZOLO EG 5 mg compresse
ARIPIRAZOLO EG 10 mg compresse
ARIPIRAZOLO EG 15 mg compresse

Prima del trattamento con ARIPIRAZOLO EG, informi il medico se soffre di

- elevati livelli di zucchero nel sangue (caratterizzati da sintomi quali sete eccessiva, produzione di grandi quantità di urina, aumento dell'appetito e sensazione di stanchezza) o storia familiare di diabete;
- epilessia (convulsioni) poiché il medico può decidere di monitorarla più strettamente;
- movimenti muscolari irregolari, involontari, soprattutto del viso;
- malattie cardiovascolari (malattie del cuore e della circolazione), storia familiare di disturbi cardiovascolari, ictus o attacco ischemico transitorio, pressione sanguigna anormale;
- trombi (coaguli di sangue nelle vene) o storia familiare di trombi, poiché gli antipsicotici sono stati associati a formazione di trombi nel sangue;
- passata esperienza di gioco d'azzardo eccessivo.

Se nota che il suo peso sta aumentando, se sviluppa movimenti insoliti, se avverte sonnolenza che interferisce con le normali attività quotidiane, se ha difficoltà a inghiottire o se ha sintomi allergici, informi il medico.

Se lei è un paziente anziano affetto da demenza (perdita di memoria e di altre abilità mentali), lei o chi si prende cura di lei deve informare il medico nel caso in cui lei abbia avuto in passato un ictus o un "mini" ictus.

Informi il medico immediatamente se sta pensando di volersi fare del male. Durante il trattamento con aripirazolo sono stati riportati ideazione e comportamenti suicidari.

Informi immediatamente il medico se soffre di intorpidimento o rigidità muscolare con febbre alta, sudorazione, stato mentale alterato o battito cardiaco molto accelerato o irregolare.

Informi il medico se lei, i suoi familiari o chi si prende cura di lei, notate che lei sta sviluppando uno stimolo o desiderio di comportarsi in modi per lei insoliti e che non riesce a resistere all'impulso, alla spinta o alla tentazione di compiere certe attività che possono danneggiare lei stesso o gli altri. Tali fenomeni sono chiamati disturbi del controllo degli impulsi e possono includere comportamenti come dipendenza da gioco d'azzardo, alimentazione o spese eccessive, desiderio sessuale insolitamente elevato o preoccupazione dovuta all'aumento di pensieri o di sensazioni sessuali. Il medico può ritenere necessario aggiustare la dose o interrompere la sua terapia.

Aripirazolo può causare sonnolenza, abbassamento della pressione sanguigna quando ci si alza in piedi, capogiri e modificazioni della capacità di muoversi e stare in equilibrio, il che può indurre cadute. Fare attenzione, soprattutto se si è anziani o in qualche modo debilitati.

Bambini e adolescenti

Non usi questo medicinale in bambini e adolescenti d'età inferiore a 13 anni. Non è noto se sia sicuro ed efficace in questi pazienti.

Altri medicinali e ARIPIRAZOLO EG

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Medicinali che abbassano la pressione sanguigna

L'aripirazolo può aumentare l'effetto dei medicinali usati per abbassare la pressione sanguigna. Si assicuri di informare il medico se prende un medicinale per controllare la pressione sanguigna.

ARIPIPRAZOLO EG 5 mg compresse
ARIPIPRAZOLO EG 10 mg compresse
ARIPIPRAZOLO EG 15 mg compresse

Se prende ARIPIPRAZOLO EG con altri medicinali significa che il medico necessiterà di cambiare il dosaggio di ARIPIPRAZOLO EG o degli altri medicinali. È importante informare il medico in particolare se sta prendendo i seguenti medicinali:

- medicinali che correggono il ritmo cardiaco (ad esempio chinidina, amiodarone, flecainide);
- antidepressivi o rimedi erboristici utilizzati per trattare la depressione e l'ansia (ad esempio fluoxetina, paroxetina, venlafaxina, erba di san Giovanni);
- medicinali antifungini (ad esempio ketoconazolo, itraconazolo);
- alcuni medicinali per il trattamento dell'infezione da virus dell'HIV (ad esempio efavirenz, nevirapina, un inibitore della proteasi come indinavir, ritonavir);
- anticonvulsivanti utilizzati per trattare l'epilessia (ad esempio carbamazepina, fenitoina, fenobarbital);
- alcuni antibiotici utilizzati per trattare la tubercolosi (rifabutina, rifampicina).

Questi medicinali possono aumentare il rischio di effetti indesiderati o ridurre l'effetto di ARIPIPRAZOLO EG; consulti il medico se accusa qualsiasi sintomo insolito mentre sta prendendo uno qualsiasi di questi medicinali insieme ad ARIPIPRAZOLO EG.

I medicinali che aumentano il livello di serotonina sono tipicamente usati in condizioni come depressione, disturbo d'ansia generalizzata, disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) e fobia sociale, nonché emicrania e dolore:

- triptani, tramadolo e triptofano usati in condizioni come depressione, disturbo d'ansia generalizzata, disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) e fobia sociale, nonché emicrania e dolore;
- SSRI (ad esempio paroxetina e fluoxetina) usati per depressione, DOC, panico e ansia;
- altri antidepressivi (ad esempio venlafaxina e triptofano) usati nella depressione maggiore;
- triciclici (ad esempio clomipramina e amitriptilina) usati per la malattia depressiva;
- erba di san Giovanni (*Hypericum perforatum*), usata come rimedio erboristico per la depressione lieve;
- antidolorifici (ad esempio tramadolo e petidina) usati per alleviare il dolore;
- triptani (ad esempio sumatriptan e zolmitriptan) usati per il trattamento dell'emicrania.

Questi medicinali possono aumentare il rischio di effetti indesiderati; consulti il medico se accusa qualsiasi sintomo insolito mentre sta prendendo uno qualsiasi di questi medicinali insieme ad ARIPIPRAZOLO EG.

ARIPIPRAZOLO EG con cibi, bevande e alcol

Questo medicinale può essere assunto indipendentemente dal cibo.
Eviti l'uso di alcol.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

I seguenti sintomi si possono verificare nei neonati di madri che hanno usato aripiprazolo nell'ultimo trimestre (ultimi tre mesi di gravidanza): tremore, rigidità e/o debolezza muscolare, sonnolenza, agitazione, problemi respiratori e difficoltà di alimentazione. Se il bambino presenta uno di questi sintomi può essere necessario contattare il medico.

Se sta prendendo ARIPIPRAZOLO EG, il medico discuterà con lei se deve allattare, considerando il beneficio che lei riceve dalla terapia e il beneficio per il bambino derivante dall'allattamento. Una scelta esclude l'altra. Se sta prendendo questo medicinale, discuta con il medico il modo migliore per nutrire il bambino.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

ARIPIPRAZOLO EG 5 mg compresse
ARIPIPRAZOLO EG 10 mg compresse
ARIPIPRAZOLO EG 15 mg compresse

Durante il trattamento con questo medicinale possono manifestarsi capogiro e disturbi alla vista (vedere paragrafo 4). Di ciò va tenuto conto nei casi in cui sia necessaria la piena vigilanza, per esempio durante la guida di un veicolo o l'utilizzo di macchinari.

ARIPIPRAZOLO EG contiene lattosio e sodio

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa, cioè essenzialmente 'senza sodio'.

3. Come prendere ARIPIPRAZOLO EG

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata negli adulti è di 15 mg una volta al giorno. Tuttavia il medico può prescrivere una dose più bassa o più alta fino ad un massimo di 30 mg una volta al giorno.

Uso nei bambini e negli adolescenti

Aripiprazolo può essere iniziato con una dose più bassa utilizzando la soluzione orale (liquida). Se è necessaria una soluzione orale, il medico proporrà un altro prodotto a base di aripiprazolo. La dose può essere aumentata gradualmente fino **alla dose raccomandata per gli adolescenti di 10 mg una volta al giorno.** Tuttavia il medico può prescrivere una dose più bassa o più alta fino ad un massimo di 30 mg una volta al giorno.

Se ha l'impressione che l'effetto di ARIPIPRAZOLO EG sia troppo forte o troppo debole, consulti il medico o il farmacista.

Modo di somministrazione

Cerchi di prendere ARIPIPRAZOLO EG ogni giorno alla stessa ora. Non importa se l'assume con il cibo o no. Assuma sempre la compressa con acqua ingoiandola intera.

Anche se si sente bene, non modifichi o sospenda la dose giornaliera di ARIPIPRAZOLO EG senza prima aver consultato il medico.

Se prende più ARIPIPRAZOLO EG di quanto deve

Se si dovesse rendere conto di aver preso più compresse di ARIPIPRAZOLO EG di quanto le abbia raccomandato il medico (o se qualcun altro ha preso alcune delle sue compresse di ARIPIPRAZOLO EG), contatti il medico immediatamente. Se non può raggiungere il medico, vada al più vicino ospedale e porti con sé la confezione.

I pazienti che hanno preso troppo aripiprazolo hanno avuto i seguenti sintomi:

- battito cardiaco rapido, agitazione/aggressività, problemi nel linguaggio;
- movimenti inusuali (specialmente del viso o della lingua) e livello ridotto di coscienza.

Altri sintomi possono includere:

- stato confusionale acuto, convulsioni (epilessia), coma, una combinazione di febbre, respiro accelerato, sudorazione;

ARIPIPRAZOLO EG 5 mg compresse
ARIPIPRAZOLO EG 10 mg compresse
ARIPIPRAZOLO EG 15 mg compresse

- rigidità muscolare e assopimento o sonnolenza, respiro rallentato, sensazione di soffocamento, pressione sanguigna alta o bassa, alterazioni del ritmo cardiaco.

Contatti immediatamente il medico o l'ospedale se ha uno qualsiasi di questi sintomi.

Se dimentica di prendere ARIPIPRAZOLO EG

Se dovesse dimenticare una dose, la prenda appena se ne ricorda ma non prenda due dosi nello stesso giorno. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con ARIPIPRAZOLO EG

Non interrompa il trattamento solo perché si sente meglio. È importante continuare a prendere ARIPIPRAZOLO EG per l'intero periodo indicato dal medico.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10):

- diabete mellito;
- difficoltà nel dormire;
- sentirsi ansiosi;
- sentirsi irrequieti e incapaci di stare fermi, difficoltà a rimanere seduti;
- contrazioni muscolari incontrollabili, movimenti a scatto o contorsioni, irrequietezza alle gambe;
- tremori;
- mal di testa;
- stanchezza;
- sonnolenza;
- sensazione di testa leggera;
- agitazione e visione offuscata;
- ridotto numero di evacuazioni o difficoltà a evacuare;
- cattiva digestione;
- nausea;
- aumentata produzione di saliva;
- vomito;
- sensazione di stanchezza.

Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100):

- aumento dei livelli dell'ormone prolattina nel sangue;
- alti livelli di zucchero nel sangue;
- depressione;
- alterazione o aumento dell'interesse sessuale;
- movimenti incontrollabili della bocca, della lingua e degli arti (discinesia tardiva);
- disturbo muscolare che causa movimenti di torsione (distonia);
- visione doppia;
- sensibilità dell'occhio alla luce;
- ritmo cardiaco accelerato;

ARIPIPRAZOLO EG 5 mg compresse
ARIPIPRAZOLO EG 10 mg compresse
ARIPIPRAZOLO EG 15 mg compresse

- abbassamento della pressione arteriosa quando ci si alza in piedi, che provoca capogiro, sensazione di testa leggera o svenimento;
- singhiozzo.

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

Gli effetti indesiderati che seguono sono stati riportati dall'inizio della commercializzazione di aripiprazolo orale ma la frequenza con la quale si sono verificati non è nota:

- bassi livelli di globuli bianchi;
- bassi livelli di piastrine;
- reazione allergica (per es. gonfiore della bocca, della lingua, del viso e della gola, prurito, orticaria);
- inizio o peggioramento di uno stato diabetico, chetoacidosi (chetoni nel sangue e nell'urina) o coma;
- alti livelli di zucchero nel sangue;
- basso livello di sodio nel sangue;
- perdita dell'appetito (anoressia);
- perdita di peso;
- aumento di peso;
- pensieri di suicidio, tentato suicidio e suicidio;
- sensazione di aggressività;
- agitazione;
- nervosismo;
- combinazione di febbre, rigidità muscolare, respiro accelerato, sudorazione, coscienza ridotta e improvvisi cambi di pressione e del ritmo cardiaco, svenimento (sindrome neurolettica maligna);
- convulsioni;
- sindrome serotoninergica (una reazione che può causare sensazione di grande felicità, sonnolenza, goffaggine, irrequietezza, sensazione di essere ubriaco, febbre, sudorazione o rigidità muscolare);
- disturbi nel parlare;
- bulbi oculari fissati in un'unica posizione;
- morte improvvisa inspiegabile;
- battito cardiaco irregolare potenzialmente fatale;
- attacco di cuore;
- battito cardiaco rallentato;
- coaguli di sangue nelle vene, soprattutto nelle gambe (i sintomi comprendono gonfiore, dolore ed arrossamento della gamba), che, attraverso i vasi sanguigni, possono raggiungere i polmoni causando dolore toracico e difficoltà di respirazione (se nota qualcuno di questi sintomi, chiedi immediatamente consiglio al medico);
- pressione arteriosa alta;
- svenimento;
- inalazione accidentale di cibo con rischio di polmonite (infezione dei polmoni);
- spasmo dei muscoli attorno alla laringe;
- infiammazione del pancreas;
- difficoltà a deglutire;
- diarrea;
- disagio addominale;
- disagio allo stomaco;
- insufficienza epatica;
- infiammazione del fegato;
- ingiallimento della pelle e della parte bianca degli occhi;
- casi di valori anormali di esami di funzionalità del fegato;
- eruzione cutanea;

ARIPIRAZOLO EG 5 mg compresse
ARIPIRAZOLO EG 10 mg compresse
ARIPIRAZOLO EG 15 mg compresse

- sensibilità alla luce;
- calvizie;
- sudorazione eccessiva;
- disgregazione anomala dei muscoli che può causare problemi renali;
- dolore muscolare;
- rigidità;
- perdita involontaria di urina (incontinenza);
- difficoltà a urinare;
- sintomi da astinenza nei neonati in caso di esposizione durante la gravidanza;
- erezione prolungata e/o dolorosa;
- difficoltà nel controllare la temperatura corporea interna o condizioni di calore eccessivo;
- dolore al torace;
- gonfiore alle mani, alle caviglie o ai piedi;
- negli esami del sangue: aumento o fluttuazione dei livelli dello zucchero nel sangue, emoglobina glicosilata aumentata;
- incapacità di resistere all'impulso, alla spinta o alla tentazione di compiere un'azione che può essere dannosa per lei o per gli altri, che può includere:
 - forte impulso a scommettere in modo eccessivo nonostante gravi conseguenze personali o familiari;
 - interesse sessuale alterato o aumentato e comportamento che causa preoccupazione significativa a lei o agli altri, per esempio un aumento della spinta sessuale;
 - shopping o spese eccessive e incontrollabili;
 - alimentazione incontrollata (mangiare grandi quantità di cibo in un breve periodo di tempo) o alimentazione compulsiva (mangiare più cibo del normale e più di quanto serve a soddisfare il proprio appetito).
 - tendenza ad allontanarsi.

Informi il medico se manifesta uno di questi comportamenti; le spiegherà come gestire o ridurre i sintomi.

In pazienti anziani con demenza, durante l'assunzione di aripirazolo, sono stati riportati più casi fatali. Inoltre, sono stati riportati casi di ictus o "mini" ictus.

Effetti indesiderati aggiuntivi nei bambini e negli adolescenti

Adolescenti a partire da 13 anni di età hanno avuto effetti indesiderati simili, come frequenza e tipo, a quelli degli adulti, eccetto per sonnolenza, contrazioni muscolari incontrollabili o movimenti a scatto, irrequietezza e stanchezza che sono stati molto comuni (più di 1 paziente su 10) e per dolore nella parte superiore dell'addome, bocca secca, aumento della frequenza cardiaca, aumento di peso, aumento dell'appetito, contrazione muscolare, movimenti incontrollati degli arti e sensazione di vertigine, soprattutto sollevandosi da una posizione sdraiata o seduta, che sono stati comuni (più di 1 paziente su 100).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare ARIPIRAZOLO EG

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sul blister e sulla scatola.

ARIPIPRAZOLO EG 5 mg compresse
ARIPIPRAZOLO EG 10 mg compresse
ARIPIPRAZOLO EG 15 mg compresse

Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene ARIPIPRAZOLO EG

- Il principio attivo è aripiprazolo.
Ogni compressa contiene 5 mg di aripiprazolo.
Ogni compressa contiene 10 mg di aripiprazolo
Ogni compressa contiene 15 mg di aripiprazolo
- Gli altri componenti sono mannitolo, maltodestrina, cellulosa microcristallina, crospovidone tipo B (Ph. Eur.), sodio bicarbonato, acido tartarico, silice colloidale anidra, saccarina sodica (E954), aroma di crema alla vaniglia (sostanze aromatizzanti, sostanze aromatizzanti naturali, lattosio, magnesio carbonato idrossido), magnesio stearato (Ph. Eur.).
ARIPIPRAZOLO EG 5 mg: indigotina lacca di alluminio (E132)
ARIPIPRAZOLO EG 10 mg: ossido di ferro rosso (E172)
ARIPIPRAZOLO EG 15 mg: ossido di ferro giallo (E172)

Descrizione dell'aspetto di ARIPIPRAZOLO EG e contenuto della confezione

ARIPIPRAZOLO EG 5 mg compresse si presenta in forma di compresse rotonde, piatte, di colore blu chiaro con macchie sparse e un diametro di 6 mm.

ARIPIPRAZOLO EG 10 mg compresse si presenta in forma di compresse rotonde, piatte, di colore rosa chiaro con macchie sparse e un diametro di 8 mm.

ARIPIPRAZOLO EG 15 mg compresse si presenta in forma di compresse rotonde, piatte, di colore giallo chiaro con macchie sparse e un diametro di 10 mm.

Sono fornite in blister confezionati in scatole di cartone contenenti

5 mg: 14, 28, 49, 98 compresse

10 mg: 14, 28, 49, 98 compresse

15 mg: 14, 28, 49, 98 compresse

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

EG S.p.A., Via Pavia 6, 20136 Milano

Produttore

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18 Bad Vilbel 61118 - Germania

Clonmel Healthcare Ltd, Waterford Road Clonmel, Co. Tipperary - Irlanda

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:

Germania	Aripiprazol AL 5 mg Tabletten Aripiprazol AL 10 mg Tabletten Aripiprazol AL 15 mg Tabletten Aripiprazol AL 30 mg Tabletten
----------	---

ARIPIPAZOLO EG 5 mg compresse
ARIPIPAZOLO EG 10 mg compresse
ARIPIPAZOLO EG 15 mg compresse

Irlanda	Aripiprazole Clonmel 5 mg tablets Aripiprazole Clonmel 10 mg tablets Aripiprazole Clonmel 15 mg tablets Aripiprazole Clonmel 30 mg tablets
Italia	Aripiprazolo EG 5 mg compresse Aripiprazolo EG 10 mg compresse Aripiprazolo EG 15 mg compresse

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 14 Giugno 2022