

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore**LAMPARD 50.000 U.I./5 ml soluzione orale
colecalfiferolo**

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è LAMPARD e per che cosa è usato
2. Cosa deve sapere prima di prendere LAMPARD
3. Come prendere LAMPARD
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare LAMPARD
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. CHE COS'È LAMPARD E PER CHE COSA È USATO

LAMPARD contiene colecalfiferolo (Vitamina D).

LAMPARD è indicato per il trattamento della carenza di vitamina D negli adulti (età superiore ai 18 anni).

2. COSA DEVE SAPERE PRIMA DI PRENDERE LAMPARD**Non prenda LAMPARD**

- se è allergico alla vitamina D o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se ha livelli elevati di calcio nel sangue (ipercalcemia) o nelle urine (ipercalcinuria)
- se soffre di calcoli renali;
- se soffre di scarso funzionamento dei reni (insufficienza renale) (vedere anche "Avvertenze e precauzioni").

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere LAMPARD.

Il medico potrebbe prescrivere dosaggi diversi rispetto a quanto riportato in "*Come prendere LAMPARD*" nei seguenti casi:

- se sta seguendo un trattamento con medicinali anticonvulsivanti o barbiturici (vedere anche "*Altri medicinali e LAMPARD*");
- se sta seguendo un trattamento con medicinali contenenti ormoni corticosteroidi (vedere anche "*Altri medicinali e LAMPARD*");
- se sta seguendo un trattamento con medicinali che abbassano i livelli dei grassi nel sangue (come ad esempio colestipolo, colestiramina e orlistat) (vedere anche "*Altri medicinali e LAMPARD*");
- se sta seguendo un trattamento con medicinali antiacidi contenenti alluminio (vedere anche "*Altri medicinali e LAMPARD*");
- se è in sovrappeso;
- se soffre di malattie digestive (malassorbimento intestinale, mucoviscidosi o fibrosi cistica);
- se soffre di scarso funzionamento del fegato;
- se soffre di alcolismo cronico o se assume altri prodotti che contengono vitamina D, cibi addizionati con vitamina D o in caso di utilizzo di latte arricchito con vitamina D (vedere anche "*LAMPARD con cibo, bevande o alcool*").

Il medico potrà prescrivere analisi periodiche per controllare i livelli di vitamina D o calcio nel sangue e nelle urine nei seguenti casi:

- se deve seguire il trattamento con LAMPARD per un lungo periodo;
- se è una persona anziana in trattamento con medicinali che agiscono sul cuore contenenti digitale o con medicinali diuretici;
- se soffre di sarcoidosi (una malattia che interessa i tessuti connettivi).

Nel caso in cui i suoi livelli di vitamina D o di calcio fossero elevati, il suo medico ridurrà la dose o interromperà il trattamento con LAMPARD.

In generale non dovrebbe assumere LAMPARD se soffre di scarso funzionamento dei reni (vedere “*Non prenda LAMPARD*”); ma se il medico ritiene che il trattamento con LAMPARD sia assolutamente necessario, dovrà effettuare delle analisi periodiche per controllare i livelli di calcio nel sangue. Nel caso in cui i suoi livelli di calcio fossero elevati, il suo medico ridurrà la dose o interromperà il trattamento con LAMPARD.

Bambini e adolescenti

LAMPARD 50.000 U.I. soluzione orale non è raccomandato nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 0 e 18 anni.

Altri medicinali e LAMPARD

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

Informi il suo medico in modo particolare se sta prendendo:

- medicinali anticonvulsivanti o barbiturici (medicinali utilizzati per trattare l'epilessia) perché, quando assunti contemporaneamente a LAMPARD, potrebbero ridurre l'effetto di quest'ultimo;
- medicinali diuretici (medicinali utilizzati per trattare la pressione alta), perché riducono l'eliminazione del calcio dall'organismo. In questo caso, il suo medico potrebbe chiederle alcune analisi per controllare il livello del calcio nel sangue e nelle urine;
- medicinali contenenti corticosteroidi (medicinali utilizzati per trattare le infiammazioni) perché, quando assunti contemporaneamente a LAMPARD, potrebbero ridurre l'effetto di quest'ultimo;
- medicinali contenenti la digitale (ad esempio, digossina) utilizzati per alcune malattie del cuore: la tossicità di questi medicinali può aumentare quando assunti insieme a LAMPARD;
- medicinali antiacidi contenenti alluminio, perché, quando assunti contemporaneamente a LAMPARD, potrebbero ridurre l'effetto di quest'ultimo;
- medicinali contenenti magnesio, perché, quando assunti contemporaneamente a LAMPARD, si potrebbero verificare livelli elevati di magnesio nel sangue (ipermagnesiemia);
- warfarin (medicinale anticoagulante utilizzato per la prevenzione della formazione di coaguli di sangue), perché, quando assunto contemporaneamente a LAMPARD, il suo effetto anticoagulante potrebbe aumentare, provocando emorragie;
- colestiramina, colestipolo e orlistat (medicinali utilizzati per trattare il colesterolo alto), perché, quando assunti contemporaneamente a LAMPARD, potrebbero ridurre l'effetto di quest'ultimo.

LAMPARD con cibo, bevande e alcool

Informi il suo medico nei seguenti casi:

- se soffre di alcoolismo cronico;
- se assume altri prodotti che contengono vitamina D, cibi addizionati con vitamina D o in caso di utilizzo di latte arricchito con vitamina D.

Gravidanza e allattamento Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno, chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Gravidanza

Durante i primi 6 mesi di gravidanza il medico le prescriverà la vitamina D se ritenuto strettamente necessario, per il rischio di effetti dannosi al feto (vedere paragrafo 3. “Se prende più LAMPARD di quanto deve”).

LAMPARD 50.000 U.I. soluzione orale non è raccomandato in gravidanza.

Poiché tuttavia la carenza di vitamina D è nociva sia per la madre che per il feto, quando necessario il medico le prescriverà la vitamina D durante la gravidanza a dosaggi più bassi.

Allattamento

LAMPARD 50.000 U.I. soluzione orale non è raccomandato durante l'allattamento.

Quando necessario, il medico le prescriverà la vitamina D durante l'allattamento a dosaggi più bassi. Questo non sostituisce la somministrazione di vitamina D nel neonato. La vitamina D e i suoi metaboliti si ritrovano nel latte materno. Questo aspetto deve essere preso in considerazione quando si somministra al bambino ulteriore vitamina D.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non sono disponibili dati sugli effetti di LAMPARD sulla capacità di guidare. Tuttavia, un effetto su tale capacità è improbabile. In ogni caso, poiché si può manifestare sonnolenza come effetto indesiderato del trattamento con LAMPARD, tenga conto di questo se deve mettersi alla guida di veicoli o debba utilizzare macchinari.

3. COME PRENDERE LAMPARD

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Si raccomanda di assumere LAMPARD durante i pasti.

Le dosi raccomandate sono riportate di seguito; queste verranno adattate dal suo medico sulla base della natura e gravità del suo stato di mancanza di vitamina D (vedere anche “Avvertenze e precauzioni”). Il suo medico le dirà quando può interrompere l'assunzione del medicinale.

Adulti e Anziani

Trattamento:

1 contenitore monodose (pari a 50.000 U.I. di vitamina D₃) una volta alla settimana per un massimo di 6 settimane. Il medico stabilirà la dose adeguata per lei e successivamente potrà prescriverle una dose più bassa.

Popolazione pediatrica

L'uso di LAMPARD 50.000 U.I. soluzione orale non è raccomandato in neonati, bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni.

Donne in gravidanza

L'uso di LAMPARD 50.000 U.I. soluzione orale non è raccomandato in gravidanza.

Se prende più LAMPARD di quanto deve

Dosi troppo elevate di LAMPARD possono provocare livelli molto elevati di calcio nel sangue (ipercalcemia) e nelle urine (ipercalcinuria) i cui sintomi sono nausea, vomito, sete, sete eccessiva (polidipsia), quantità di urina superiore al normale (poliuria), stitichezza e disidratazione.

Livelli di calcio elevati mantenuti per lunghi periodi possono provocare il deposito di calcio nelle arterie, nelle vene e negli organi.

L'assunzione di vitamina D durante i primi 6 mesi di gravidanza può causare livelli elevati di calcio nel sangue della madre che possono essere causa di malformazioni del feto (ritardo dello sviluppo fisico e mentale del bambino, restringimento dell'apertura dell'aorta nella vicinanza del cuore, danni alla retina, problemi nel funzionamento delle ghiandole paratiroidee alla nascita con conseguenti livelli bassi di calcio nel sangue del bambino che provocano contrazioni muscolari involontarie e convulsioni).

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di LAMPARD avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

Se dimentica di prendere una dose di LAMPARD

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

La frequenza dei possibili effetti indesiderati è definita secondo la seguente convenzione:

- molto comune: può interessare più di una persona su 10
- comune: può interessare fino a 1 persona su 10
- non comune: può interessare fino a 1 persona su 100
- raro: può interessare fino a 1 persona su 1000
- molto raro: può interessare fino a 1 persona su 10.000
- non nota: la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili.

Se manifesta uno dei seguenti effetti indesiderati, interrompa l'assunzione del medicinale e si rivolga immediatamente al medico o al pronto soccorso più vicino:

- **Reazioni allergiche gravi (rare: possono interessare fino a 1 persona su 1000): gonfiore del viso, della lingua e/o della gola, difficoltà di deglutizione, orticaria.**

Gli altri possibili effetti indesiderati sono:

Non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100)

- Ipercalcemia (livelli di calcio in eccesso nel sangue)
- Ipercalcinuria (livelli di calcio in eccesso nelle urine)

Rari (possono interessare fino a 1 persona su 1.000)

- Stato confusionale
- Anoressia (perdita di appetito)
- Debolezza muscolare
- Sonnolenza
- Sete
- Prurito
- Eruzioni cutanee
- Orticaria
- Costipazione
- Flatulenza
- Nausea
- Dolore addominale
- Diarrea

Altri effetti indesiderati (frequenza non nota)

- Insufficienza renale (scarso funzionamento dei reni)
- Calcoli renali
- Poliuria (quantità di urina superiore al normale)
- Polidipsia (sete eccessiva)
- Cefalea
- Vomito
- Gusto metallico
- Secchezza della bocca

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può, inoltre, segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. COME CONSERVARE LAMPARD

Tenga questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese e si intende per il medicinale in confezionamento integro, correttamente conservato.

Conservi questo medicinale a temperatura non superiore ai 30°C. Non lo congeli.

Conservi questo medicinale nella confezione originale per tenerlo al riparo dalla luce.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E ALTRE INFORMAZIONI

Cosa contiene LAMPARD 50.000 U.I./5 ml soluzione orale

- Il principio attivo è colecalciferolo (vitamina D). Ogni contenitore monodose contiene 1,25 mg pari a 50.000 U.I. di principio attivo.

- L'altro componente è olio di oliva raffinato.

Descrizione dell'aspetto di LAMPARD e contenuto della confezione

LAMPARD 50.000 U.I./5 ml soluzione orale in contenitore monodose: contenitore monodose in vetro ambrato contenente 5 ml di soluzione, chiuso con una capsula in polietilene. Confezioni da 1 o da 2 o da 4 contenitori monodose.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Mylan S.p.A. - Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano - Italia

Produttore

Special Product's Line Spa Via Fratta Rotonda Vado Largo, 1 Anagni (FR)

Savio Industrial s.r.l. Via Emilia, 21 - 27100 Pavia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: Marzo 2021