

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

Perindopril e Amlodipina Teva Italia 5 mg/5 mg compresse
Perindopril e Amlodipina Teva Italia 5 mg/10 mg compresse
Perindopril e Amlodipina Teva Italia 10 mg/5 mg compresse
Perindopril e Amlodipina Teva Italia 10 mg/10 mg compresse

perindopril tosilato/amlodipina

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio

1. Cos'è Perindopril e Amlodipina Teva Italia e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Perindopril e Amlodipina Teva Italia
3. Come prendere Perindopril e Amlodipina Teva Italia
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Perindopril e Amlodipina Teva Italia
6. Contenuto della confezione e altre informazioni.

1. Cos'è Perindopril e Amlodipina Teva Italia e a cosa serve

Perindopril e Amlodipina Teva Italia è un'associazione di due principi attivi, perindopril e amlodipina.

Perindopril e Amlodipina Teva Italia **5 mg/5 mg compresse** contiene 5 mg di perindopril tosilato e 5 mg di amlodipina.

Perindopril e Amlodipina Teva Italia **5 mg/10 mg compresse** contiene 5 mg di perindopril tosilato e 10 mg di amlodipina.

Perindopril e Amlodipina Teva Italia **10 mg/5 mg compresse** contiene 10 mg di perindopril tosilato e 5 mg di amlodipina.

Perindopril e Amlodipina Teva Italia **10 mg/10 mg compresse** contiene 10 mg di perindopril tosilato e 10 mg di amlodipina.

Perindopril e Amlodipina Teva Italia è prescritto per il trattamento della pressione alta (ipertensione) e/o per il trattamento della coronaropatia stabile (condizione in cui l'apporto di sangue al cuore risulta ridotto o bloccato).

I pazienti che assumono già il perindopril e l'amlodipina in compresse separate possono assumere al loro posto una sola compressa di Perindopril e Amlodipina Teva Italia che contiene entrambi i principi attivi.

Il perindopril è un ACE (enzima di conversione dell'angiotensina) inibitore. L'amlodipina è un calcio antagonista (appartenente alla classe di farmaci denominata diidropiridine).

In associazione, essi agiscono dilatando e rilassando i vasi sanguigni in modo tale da rendere più facile per il sangue passarvi attraverso e per il cuore mantenere un buon livello di flusso sanguigno.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Perindopril e Amlodipina Teva Italia

Non prenda Perindopril e Amlodipina Teva Italia se

- è allergico al perindopril o a qualunque altro ACE inibitore, oppure all'amlodipina o a qualunque altro calcio antagonista, oppure ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6)
- è in stato di gravidanza da più di tre mesi (è meglio evitare Perindopril e Amlodipina Teva Italia anche nella fase iniziale della gravidanza - vedere il paragrafo 2: "Gravidanza e allattamento")
- ha avuto sintomi come respiro sibilante, gonfiore del viso o della lingua, prurito intenso o gravi eruzioni cutanee durante un precedente trattamento con gli ACE inibitori, o se lei o un suo familiare ha accusato tali sintomi in qualunque altra circostanza (condizione chiamata angioedema)
- presenta un restringimento della valvola cardiaca aortica (stenosi aortica)
- presenta shock cardiogeno (condizione nella quale il cuore non è in grado di apportare all'organismo una quantità di sangue sufficiente)
- è affetto da grave pressione arteriosa bassa (ipotensione)
- soffre di insufficienza cardiaca in seguito ad un attacco di cuore
- soffre di diabete, o la sua funzione renale è compromessa ed è in trattamento con un medicinale che abbassa la pressione del sangue, contenente aliskiren
- ha assunto o sta attualmente assumendo sacubitril/valsartan, un medicinale usato per trattare un tipo di insufficienza cardiaca a lungo termine (cronica) negli adulti, poiché il rischio di angioedema (rapido gonfiore sottocutaneo in un'area come la gola) è aumentato
- è sottoposto a dialisi o a qualunque tipo di filtrazione del sangue. A seconda del macchinario utilizzato, Perindopril e Amlodipina Teva Italia potrebbe non essere adatto a lei
- ha problemi ai reni, con diminuzione dell'afflusso di sangue ai reni (stenosi arteriosa renale).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Perindopril e Amlodipina Teva Italia se ha una delle seguenti condizioni:

- Cardiomiopatia ipertrofica (malattia del muscolo cardiaco) o una stenosi dell'arteria renale (restringimento dell'arteria che apporta il sangue ai reni).
- Insufficienza cardiaca.
- Grave aumento della pressione arteriosa (crisi ipertensiva).
- Altri problemi cardiaci.
- Problemi di fegato.
- Problemi renali o se è in dialisi.
- Ha livelli anormalmente elevati di un ormone chiamato aldosterone nel sangue (aldosteronismo primario).
- Malattia vascolare del collagene (malattia del tessuto connettivo) come il lupus eritematoso sistemico o la sclerodermia.
- Diabete.
- Se segue una dieta che prevede una limitazione nell'uso del sale, o usa sostituti del sale contenenti potassio (è essenziale un livello ematico di potassio ben equilibrato).
- Se è anziano e il dosaggio deve essere aumentato.
- Se sta assumendo uno qualsiasi dei seguenti medicinali, il rischio di reazioni allergiche gravi (angioedema) può essere aumentato: racecadotril, inibitori di mTOR, vildagliptin, sacubitril, vedere **"Altri medicinali e Perindopril e Amlodipina Teva Italia"**.
- Se è un paziente di etnia nera, questo medicinale può aumentare il rischio di gravi reazioni allergiche (angioedema) e può essere meno efficace nel ridurre la pressione sanguigna rispetto ad altri pazienti.
- Se sta assumendo uno dei seguenti medicinali usati per trattare la pressione alta del sangue:
 - un "antagonista del recettore dell'angiotensina II" (AIIRA) anche noti come sartani - per esempio valsartan, telmisartan, irbesartan, in particolare se soffre di problemi renali correlati al diabete.
 - "aliskiren".

Il medico potrebbe dover controllare la sua funzionalità renale, la pressione del sangue, e la quantità di elettroliti (ad esempio il potassio) nel sangue a intervalli regolari.

Perindopril e Amlodipina Teva Italia

Vedere anche quanto riportato alla voce "Non prenda Perindopril e Amlodipina Teva Italia".

Se prende Perindopril e Amlodipina Teva Italia, dovrebbe anche informare il suo medico o lo staff medico se:

- deve sottoporsi ad anestesia generale e/o ad un intervento chirurgico importante.
- ha avuto di recente diarrea o vomito.
- deve sottoporsi ad aferesi delle lipoproteine a bassa densità (LDL) (la depurazione del sangue dal colesterolo per mezzo di un macchinario).
- deve fare un trattamento di desensibilizzazione per ridurre gli effetti di un'allergia alle punture di api o vespe.

Bambini e adolescenti

Perindopril e Amlodipina Teva Italia è sconsigliato per l'uso nei bambini e negli adolescenti.

Altri medicinali e Perindopril e Amlodipina Teva Italia

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non deve assumere Perindopril e Amlodipina Teva Italia con:

- Litio (usato per il trattamento di mania o depressione).
- Estramustina (usata nella terapia di alcuni tipi di cancro).
- Integratori di potassio (compresi sostituti del sale), diuretici risparmiatori di potassio (triamterene, amiloride) e altri medicinali che possono aumentare la quantità di potassio nel sangue (ad es. trimetoprim e cotrimossazolo per le infezioni causate da batteri; ciclosporina, un medicinale immunosoppressore usato per prevenire il rigetto di organi trapiantati; ed eparina, un medicinale usato per fluidificare il sangue per prevenire la formazione di coaguli).
- Diuretici risparmiatori di potassio usati nel trattamento dell'insufficienza cardiaca: eplerenone e spironolattone alle dosi comprese tra 12,5mg e 50mg al giorno.

Il trattamento con Perindopril e Amlodipina Teva Italia può essere influenzato dall'assunzione di altri medicinali. Si assicuri di informare il medico se sta assumendo uno dei seguenti medicinali in quanto potrebbe essere necessaria un'attenzione particolare:

- Medicinali utilizzati principalmente per il trattamento della diarrea (racecadotril) o per la prevenzione del rigetto a seguito di trapianto di organi (sirolimus, everolimus, temsirolimus e altri medicinali appartenenti alla classe dei cosiddetti inibitori di mTOR, tacrolimus e vildagliptin) in quanto possono aumentare il rischio di gravi reazioni allergiche.
- Altri medicinali per il trattamento della pressione alta, inclusi antagonisti del recettore dell'angiotensina II (AIIIRA anche noti come sartani, per esempio valsartan, telmisartan, irbesartan), aliskiren o diuretici (medicinali che aumentano la quantità di urina prodotta dai reni).
- Farmaci antinfiammatori non steroidei (es. ibuprofene) per il sollievo dal dolore o dosi elevate di aspirina (acido acetil salicilico).
- Medicinali per il trattamento del diabete (come l'insulina e vildagliptin).
- Medicinali per il trattamento dei disturbi mentali quali depressione, ansia, schizofrenia (es. antidepressivi tricyclici, antipsicotici, antidepressivi simili all'imipramina, neurolettici).
- Immunosoppressori (medicinali in grado di ridurre il meccanismo di difesa dell'organismo) usati per il trattamento dei disturbi autoimmunitari o in seguito a un intervento chirurgico di trapianto (es. ciclosporina e tacrolimus).
- Allopurinolo (per il trattamento della gotta).
- Trimetoprim e cotrimossazolo (per il trattamento delle infezioni).
- Procainamide (per il trattamento del battito cardiaco irregolare).
- Vasodilatatori, inclusi i nitrati (prodotti che dilatano i vasi sanguigni).
- Efedrina, noradrenalina o adrenalina (farmaci usati per il trattamento di ipotensione, shock o asma).
- Baclofene o dantrolene (infusione) entrambi usati nel trattamento della rigidità muscolare in patologie quali la sclerosi multipla; il dantrolene è anche usato nel trattamento dell'ipertermia maligna durante l'anestesia (la sintomatologia include febbre elevatissima e rigidità muscolare).
- Alcuni antibiotici usati per trattare le infezioni batteriche come rifampicina, eritromicina, claritromicina.

Perindopril e Amlodipina Teva Italia

- Medicinali antiepilettici quali carbamazepina, fenobarbitale, fenitoina, fosfenitoina, primidone.
- Itraconazolo, ketoconazolo (farmaci usati nel trattamento delle infezioni fungine).
- Alfa-bloccanti usati per il trattamento dell'ingrossamento della prostata quali prazosina, alfuzosina, doxazosina, tamsulosina, terazosina.
- Amifostina (usata nella prevenzione o nella riduzione degli effetti collaterali causati da altri farmaci o dalla radioterapia nel trattamento del cancro).
- Corticosteroidi (usati nel trattamento di varie condizioni incluso asma grave e artrite reumatoide).
- Sali d'oro, specialmente con somministrazione endovenosa (usati nel trattamento dei sintomi dell'artrite reumatoide).
- Ritonavir, indinavir, nelfinavir (cosiddetti inibitori della proteasi utilizzati per il trattamento dell'HIV).
- Simvastatina (usato per abbassare il colesterolo).
- Sacubitril (disponibile in associazione a dose fissa con valsartan) usato per trattare l'insufficienza cardiaca cronica.
- *Hypericum perforatum* (erba di San Giovanni, un prodotto erboristico usato per il trattamento della depressione).

Perindopril e Amlodipina Teva Italia con cibi e bevande

Si consiglia di prendere Perindopril e Amlodipina Teva Italia prima del pasto.

Le persone che assumono Perindopril e Amlodipina Teva Italia non devono consumare pompelmo né bere succo di pompelmo. Questo perché il pompelmo e il relativo succo possono indurre un aumento dei livelli del principio attivo amlodipina nel sangue, e ciò può determinare un incremento imprevedibile dell'effetto di abbassamento della pressione sanguigna di Perindopril e Amlodipina Teva Italia.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Gravidanza

Deve informare il medico se pensa di essere in stato di gravidanza (*o potrebbe dare inizio ad una gravidanza*). Di norma il medico le consiglierà di interrompere l'assunzione di Perindopril e Amlodipina Teva Italia prima di dare inizio alla gravidanza, o appena lei verrà a conoscenza di essere in stato di gravidanza e le consiglierà di prendere un altro medicinale al posto di Perindopril e Amlodipina Teva Italia. Perindopril e Amlodipina Teva Italia non è raccomandato all'inizio della gravidanza, e non deve essere preso se lei è in stato di gravidanza da più di tre mesi, poiché esso può causare grave danno al bambino se preso dopo il terzo mese di gravidanza.

Allattamento

È stato dimostrato che l'amlodipina passa nel latte materno in piccole quantità. Informi il suo medico se sta allattando o se sta per iniziare l'allattamento con latte materno. Perindopril e Amlodipina Teva Italia non è raccomandato alle madri che stanno allattando, ed il suo medico potrà scegliere per lei un altro trattamento se desidera allattare, specialmente se il suo bambino è appena nato, o è nato prematuro.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Perindopril e Amlodipina Teva Italia può influenzare la sua capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Se le compresse le causano malessere, capogiri, debolezza o stanchezza, o le provocano cefalea, eviti di guidare o di usare macchinari e contatti il medico **immediatamente**.

Perindopril e Amlodipina Teva Italia contiene sodio

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa, cioè essenzialmente "senza sodio".

Perindopril e Amlodipina Teva Italia contiene isomalto

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

3. Come prendere Perindopril e Amlodipina Teva Italia

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Assuma la compressa deglutendola con dell'acqua, preferibilmente ogni giorno alla stessa ora, al mattino e comunque prima del pasto. Il suo medico deciderà la dose appropriata per lei. Solitamente la dose sarà di una compressa al giorno.

Generalmente, Perindopril e Amlodipina Teva Italia verrà prescritto ai pazienti che assumono già il perindopril e l'amlodipina in compresse separate.

Se prende più Perindopril e Amlodipina Teva Italia di quanto deve

Se ha assunto una quantità eccessiva di compresse, si rechi immediatamente al pronto soccorso più vicino o consulti **subito** il suo medico. L'effetto più probabile in caso di sovradosaggio è un abbassamento della pressione che può farle avvertire capogiri o un mancamento. In tal caso, può essere di aiuto sdraiarsi tenendo le gambe sollevate.

Il liquido in eccesso può accumularsi nei polmoni (edema polmonare) causando mancanza di respiro che può svilupparsi fino a 24-48 ore dopo l'assunzione.

Se dimentica di prendere Perindopril e Amlodipina Teva Italia

È importante assumere il medicinale tutti i giorni poiché un trattamento regolare è più efficace. Se tuttavia si dimentica di prendere una dose di Perindopril e Amlodipina Teva Italia, assuma la dose successiva il giorno seguente come di consueto. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Perindopril e Amlodipina Teva Italia

Poiché il trattamento con Perindopril e Amlodipina Teva Italia è di solito a lungo termine, parli con il suo medico prima di interrompere l'assunzione di questo medicinale.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se manifesta uno dei seguenti effetti indesiderati, smetta immediatamente di prendere il medicinale e informi **subito** il medico:

Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10):

- Forti capogiri o svenimento a causa della bassa pressione sanguigna .

Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100):

- Improvviso respiro sibilante, dolore toracico, mancanza di respiro, o difficoltà nel respirare.
- Gonfiore delle palpebre, del viso o della bocca.
- Gonfiore delle labbra, della lingua e della gola che può causare notevole difficoltà a respirare.
- Depressione.

Effetti indesiderati molto rari (possono interessare fino a 1 persona su 10.000):

- Reazioni cutanee gravi come eruzione cutanea intensa, orticaria, arrossamento della pelle su tutto il corpo, grave prurito, vesciche, desquamazione e gonfiore della cute, infiammazione delle membrane mucose (sindrome di Stevens Johnson, necrolisi epidermica) o altre reazioni allergiche.
- Debolezza a braccia o gambe, o problemi nel parlare, il che potrebbe essere segno di un possibile ictus.
- Battito cardiaco irregolare o accelerato, dolore toracico (angina) o attacco cardiaco.
- Infiammazione al pancreas che può causare dolore addominale e alla schiena di intensità grave accompagnato ad una sensazione di forte fastidio.

- Ingiallimento della pelle o degli occhi (ittero) che può essere segno di epatite.

Sono stati segnalati i seguenti effetti **indesiderati comuni**. Se **uno di questi effetti** le causa problemi o se **persiste per oltre una settimana, si rivolga al medico**.

- Effetti indesiderati molto comuni (possono verificarsi in più di 1 utilizzo su 10): edema (ritenzione idrica)
- Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10): cefalea, capogiri, sonnolenza (specialmente all'inizio del trattamento), vertigini, sensazione di torpore o formicolio agli arti, disturbi della vista (inclusa vista doppia), sensazione di rumore all'orecchio (tinnito), sentire il proprio battito cardiaco (palpitazioni), vampate di calore, confusione mentale dovuta a ipotensione, tosse, respiro corto, nausea (sensazione di malessere), vomito (stato di malessere), dolore addominale, alterazioni del gusto, dispepsia o difficoltà di digestione, diarrea, stipsi, reazioni allergiche (quali eruzioni cutanee, prurito), crampi muscolari, sensazione di stanchezza, debolezza, gonfiore alle caviglie (edema periferico).

Sono stati segnalati anche altri effetti collaterali elencati di seguito. Se avverte uno degli effetti elencati e le sembra grave o se si verificano effetti collaterali non elencati, si prega di informare il medico o il farmacista.

- Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100): sbalzi d'umore, ansia, depressione, insonnia, disturbi del sonno, tremore, perdita di coscienza, perdita della sensazione del dolore, naso infiammato o chiuso (rinite), battito cardiaco irregolare, alterate abitudini intestinali, perdita dei capelli, macchie rosse sulla pelle, colorazione anormale della pelle, dolore alla schiena, dolore muscolare o articolare, dolore al torace, difficoltà ad urinare, necessità di urinare spesso, dolore, sensazione di malessere, broncospasmo (sensazione di oppressione al petto, respiro rumoroso e corto), bocca secca (secchezza delle fauci), respiro sibilante, gonfiore del viso e della lingua (angioedema), formazione di vesciche sulla pelle, problemi renali, impotenza, aumentata sudorazione, fastidio o ingrossamento del seno negli uomini, aumento o diminuzione del peso corporeo, eccesso di eosinofili (un tipo di globuli bianchi del sangue), prurito intenso o gravi eruzioni cutanee, tachicardia, febbre, collasso, svenimento, battito cardiaco accelerato, infiammazione dei vasi sanguigni (vasculite), reazione di fotosensibilità (aumento della sensibilità della pelle al sole), malessere, cambiamenti nei parametri delle analisi di laboratorio: alti livelli di potassio nel sangue reversibile alla sospensione, bassi livelli di sodio, ipoglicemia (livelli molto bassi di zucchero nel sangue) in caso di pazienti diabetici, aumento di urea nel sangue e aumento della creatinina nel sangue.
- Effetti indesiderati rari (possono interessare fino a 1 persona su 1.000): confusione, peggioramento della psoriasi, cambiamenti nei parametri delle analisi di laboratorio: aumento dei livelli degli enzimi epatici, alti livelli di bilirubina sierica. Urine di colore scuro, sensazione di malessere (nausea) o stato di malessere (vomito), crampi muscolari, confusione e convulsioni. Questi sintomi possono essere riconducibili ad una condizione chiamata SIADH (sindrome da inappropriata secrezione dell'ormone antidiuretico). Riduzione o assenza di urina, rossore e insufficienza renale acuta.
- Effetti indesiderati molto rari (può interessare fino a 1 persona su 10.000): malattie cardiovascolari (angina pectoris, attacco cardiaco e ictus), polmonite eosinofila (una forma rara di polmonite), gonfiore delle palpebre, del viso o delle labbra, gonfiore della lingua e della gola che causano gravi difficoltà respiratorie, gravi eruzioni cutanee tra cui intense eruzioni cutanee, orticaria, arrossamento della pelle su tutto il corpo, forte prurito, comparsa di vescicole, desquamazione e gonfiore della pelle, infiammazione delle mucose (sindrome di Stevens Johnson), eruzione cutanea che spesso inizia con macchie pruriginose rosse sul viso, braccia o gambe (eritema multiforme), sensibilità alla luce, cambiamenti nei valori del sangue come un minor numero di globuli bianchi e rossi, diminuzione della emoglobina, numero più basso di piastrine nel sangue, disturbi a livello del sangue, infiammazione del pancreas che può causare grave dolore addominale e dorsale con grave disagio, alterazione della funzionalità epatica, infiammazione al fegato (epatite), ingiallimento della pelle (ittero), enzimi epatici elevati che possono influenzare un certo gonfiore addominale (gastrite), disturbo nervoso che può causare debolezza, formicolio o intorpidimento (aumento della tensione muscolare), gonfiore delle gengive, alti livelli di zucchero nel sangue (iperglicemia).
- Frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

Perindopril e Amlodipina Teva Italia

postura rigida, espressione facciale congelata, movimenti lenti e fiacchi, camminata sbilanciata, colorazione anormale della pelle, intorpidimento e dolore alle dita delle mani o dei piedi (fenomeno di Raynaud).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.

Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Perindopril e Amlodipina Teva Italia

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sul contenitore per compresse dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dall'umidità.

Tenere il contenitore ben chiuso.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Perindopril e Amlodipina Teva Italia

- I principi attivi sono perindopril tosilato e amlodipina.
Ogni compressa contiene 5 mg perindopril tosilato equivalenti a 3,4 mg di perindopril e 6,935 mg amlodipina besilato equivalenti a 5 mg di amlodipina.
Ogni compressa contiene 5 mg di perindopril tosilato equivalenti a 3,4 mg di perindopril e 13,87 mg di amlodipina besilato equivalenti a 10 mg di amlodipina.
Ogni compressa contiene 10 mg di perindopril tosilato equivalenti a 6,8 mg di perindopril e 6,935 mg di amlodipina besilato equivalenti a 5 mg di amlodipina.
Ogni compressa contiene 10 mg di perindopril tosilato equivalenti a 6,8 mg di perindopril e 13,87 mg di amlodipina besilato equivalenti a 10 mg di amlodipina.
- Gli altri componenti sono: sodio idrogeno carbonato povidone K30, isomalto, cellulosa microcristallina sodio amido glicolato (tipo A), magnesio stearato.

Descrizione dell'aspetto di Perindopril e Amlodipina Teva Italia e contenuto della confezione

Perindopril e Amlodipina Teva Italia 5 mg/5 mg compresse sono compresse bianche, ovali, biconvesse, con impresso "5/5" su un lato e lisce sull'altro lato.

Perindopril e Amlodipina Teva Italia 5 mg/10 mg compresse sono compresse bianche, rotonde, biconvesse, con impresso "5/10" su un lato e lisce sull'altro lato.

Perindopril e Amlodipina Teva Italia 10 mg/5 mg compresse sono compresse bianche, ovali, biconvesse, con impresso "10/5" su un lato e lisce sull'altro lato.

Perindopril e Amlodipina Teva Italia 10 mg/10 mg compresse sono compresse bianche, rotonde, biconvesse, con impresso "10/10" su un lato e lisce sull'altro lato.

Perindopril e Amlodipina Teva Italia sono conservate in contenitori per compresse (contenitori in polipropilene (PP) con essiccante presente nel coperchio), disponibili in confezioni da:

5mg/5mg: 10, 30 e confezioni multiple contenenti 90 (3 confezioni da 30) compresse

5mg/10mg, 10mg/5mg, 10mg/10mg: 30 e confezioni multiple contenenti 90 (3 confezioni da 30) compresse

Perindopril e Amlodipina Teva Italia

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e Produttore:

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

TEVA B.V.
Swensweg 5,
2031 GA Haarlem
Paesi Bassi

Produttore

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi út 13
4042 Debrecen
Ungheria

Teva Operations Poland Sp z.o.o
ul. Mogilska 80. 31-546
Krakow, Polonia

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio economico europeo con le seguenti denominazioni

Belgio:	Perindopril / Amlodipine Teva 5 mg/5 mg tabletten, comprimés, Tabletten Perindopril / Amlodipine Teva 5 mg/10 mg tabletten, comprimés, Tabletten Perindopril / Amlodipine Teva 10 mg/5 mg tabletten, comprimés, Tabletten Perindopril / Amlodipine Teva 10 mg/10 mg tabletten, comprimés, Tabletten
Bulgaria:	Залпам 5 mg/5 mg таблетки Zalpam 5 mg/5 mg tablets Залпам 5 mg/10 mg таблетки Zalpam 5 mg/10 mg tablets Залпам 10 mg/5 mg таблетки Zalpam 10 mg/5 mg tablets Залпам 10 mg/10 mg таблетки Zalpam 10 mg/10 mg tablets
Croazia:	Articel-Am 5 mg/5 mg tablete Articel-Am 5 mg/10 mg tablete Articel-Am 10 mg/5 mg tablete Articel-Am 10 mg/10 mg tablete
Repubblica ceca:	Perindopril tosilate/amlodipine Teva B.V
Estonia:	Perindopril/ Amlodipine Actavis
Irlanda:	Perindopril Tosilate/Amlodipine Teva B.V. 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg Tablets
Italia:	PERINDOPRIL E AMLODIPINA TEVA ITALIA
Lettonia:	Perindopril/Amlodipine Actavis 5 mg/ 5mg tabletes Perindopril / Amlodipine Actavis 5 mg/ 10 mg tabletes Perindopril/ Amlodipine Actavis 10 mg/5 mg tabletes Peridopril/ Amlidipine Actavis 10 mg/10 mg tablets
Lituania:	Perindopril tosilate/ Amlodipine Teva Pharma 10 mg/5 mg tabletės Peridopril tosilate/ Amlidipine Teva Pharma 10 mg/10 mg tabletės
Paesi Bassi:	Perindopril tosilaat/Amlodipine Teva 5 mg/5 mg tabletten Perindopril tosilaat/Amlodipine Teva 5 mg/10 mg tabletten Perindopril tosilaat/Amlodipine Teva 10 mg/5 mg tabletten Perindopril tosilaat/Amlodipine Teva 10 mg/10 mg tabletten
Polonia:	Vilpin Combi
Portogallo:	Perindopril + Amlodipina ratiopharm

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il Settembre 2022