

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

ESLICARBAZEPINA DOC 200 mg compresse

ESLICARBAZEPINA DOC 800 mg compresse

Medicinale Equivalente

Legga attentamente questo foglio prima che lei o suo figlio prenda questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è ESLICARBAZEPINA DOC e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere ESLICARBAZEPINA DOC
3. Come prendere ESLICARBAZEPINA DOC
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare ESLICARBAZEPINA DOC
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è ESLICARBAZEPINA DOC e a cosa serve

ESLICARBAZEPINA DOC contiene il principio attivo eslicarbazepina acetato.

ESLICARBAZEPINA DOC appartiene a un gruppo di medicinali chiamati antiepilettici, utilizzati per trattare l'epilessia, una condizione che comporta l'insorgenza di crisi o attacchi epilettici ripetuti.

ESLICARBAZEPINA DOC è utilizzato:

- da solo (in monoterapia) in pazienti adulti con epilessia di nuova diagnosi
- con altri medicinali antiepilettici (terapia aggiuntiva) in pazienti adulti, adolescenti e bambini di età superiore ai 6 anni che hanno delle crisi che colpiscono una parte del cervello (crisi parziali). Queste crisi possono essere seguite, ma non necessariamente, da una crisi che colpisce tutto il cervello (generalizzazione secondaria).

ESLICARBAZEPINA DOC le è stato prescritto dal medico per ridurre il numero delle crisi.

2. Cosa deve sapere prima di prendere ESLICARBAZEPINA DOC

Non prenda ESLICARBAZEPINA DOC

- se è allergico all'eslicarbazepina acetato, ad altri derivati della carbossamide (es. carbamazepina o oxcarbazepina, medicinali usati per il trattamento dell'epilessia) o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- se soffre di un certo tipo di disturbo del ritmo cardiaco (blocco atrioventricolare (AV) di secondo o terzo grado).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere ESLICARBAZEPINA DOC.

Contatti immediatamente il medico:

- se ha vescicole o una desquamazione della pelle e/o delle mucose, un'eruzione cutanea, problemi a

deglutire o a respirare, gonfiore alle labbra, al viso, alle palpebre, alla gola o alla lingua. Possono essere i segni di una reazione allergica

- se accusa confusione, un peggioramento delle crisi o una riduzione del livello di coscienza, possibili segni di bassi livelli di sodio nel sangue.

Informi il medico:

- se ha problemi renali. Il medico può dover modificare la dose. ESLICARBAZEPINA DOC non è raccomandato nei pazienti con una malattia renale grave.
- se ha problemi al fegato. ESLICARBAZEPINA DOC è sconsigliato nei pazienti con gravi problemi al fegato.
- se sta prendendo delle medicine che possono causare un'anomalia dell'ECG (elettrocardiogramma) chiamata allungamento dell'intervallo PR. Se non sa con certezza se le medicine che prende possono indurre questo effetto, ne parli con il medico.
- se soffre di una malattia del cuore come insufficienza cardiaca o attacco cardiaco, o in caso di qualsiasi disturbo del ritmo cardiaco.
- se soffre di crisi che iniziano con una scarica elettrica diffusa che interessa entrambi i lati del cervello.

Un piccolo numero di persone trattate con antiepilettici ha fatto pensieri autolesionisti (farsi del male) o suicidari. Se in qualunque momento durante l'assunzione di ESLICARBAZEPINA DOC dovesse avere pensieri di questo genere, contatti immediatamente il medico.

ESLICARBAZEPINA DOC può procurarle capogiri e/o sonnolenza, soprattutto all'inizio del trattamento. Quando prende ESLICARBAZEPINA DOC faccia particolare attenzione a evitare lesioni accidentali, come la caduta.

Faccia particolare attenzione con ESLICARBAZEPINA DOC:

Dopo la commercializzazione, in pazienti trattati con esclicarbazepina acetato sono state segnalate reazioni cutanee gravi e potenzialmente fatali, comprendenti la sindrome di Stevens-Johnson/necrolisi epidermica tossica e la reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS).

Se manifesta una grave eruzione cutanea o altri sintomi cutanei (vedere paragrafo 4), sospenda l'assunzione di ESLICARBAZEPINA DOC e si rivolga immediatamente al medico o cerchi assistenza medica.

Nei pazienti di origine cinese Han o thailandese, il rischio di reazioni cutanee gravi associate a carbamazepina o composti chimicamente correlati può essere previsto analizzando un campione di sangue di questi pazienti. Il medico saprà consigliarle se è necessario eseguire analisi del sangue prima di assumere ESLICARBAZEPINA DOC.

Bambini

ESLICARBAZEPINA DOC non deve essere somministrato ai bambini di età pari o inferiore ai 6 anni.

Altri medicinali e ESLICARBAZEPINA DOC

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale. Questo nel caso in cui qualcuno di essi interferisca con il funzionamento di ESLICARBAZEPINA DOC o ESLICARBAZEPINA DOC interferisca con il loro effetto. Informi il medico se sta assumendo:

- fenitoina (un medicinale utilizzato nel trattamento dell'epilessia) perché può essere necessario correggere la dose;
- carbamazepina (un medicinale utilizzato nel trattamento dell'epilessia) perché può essere necessario correggere la dose e i seguenti effetti indesiderati di ESLICARBAZEPINA DOC possono verificarsi con una frequenza più elevata: sdoppiamento della vista, coordinazione anormale e capogiri;
- contraccettivi ormonali (come la pillola contraccettiva) poiché ESLICARBAZEPINA DOC può rendere questi meno efficaci;
- simvastatina (un medicinale usato per abbassare i livelli di colesterolo) perché può essere necessario correggere la dose;

- rosuvastatina, un medicinale utilizzato per abbassare il livello di colesterolo;
- l'anticoagulante warfarin;
- antidepressivi triciclici come l'amitriptilina;
- non assuma oxcarbazepina (un medicinale utilizzato nel trattamento dell'epilessia) con ESLICARBAZEPINA DOC poiché non si sa se sia sicuro assumere questi medicinali insieme.

Vedere il paragrafo 'Gravidanza e allattamento' per i consigli sulla contraccezione.

Gravidanza e allattamento

Si sconsiglia di prendere ESLICARBAZEPINA DOC durante la gravidanza, poiché gli effetti di ESLICARBAZEPINA DOC sulla gravidanza e sul nascituro non sono noti.

Se sta pianificando una gravidanza, si rivolga al medico prima di interrompere l'uso dei contraccettivi e di iniziare la gravidanza. Il medico potrebbe decidere di modificare il trattamento.

I dati relativi all'uso di eslicarbazepina acetato in donne in gravidanza sono limitati.

La ricerca ha evidenziato un rischio più elevato di malformazioni congenite e di problemi dello sviluppo neurologico (sviluppo del cervello) nei figli di donne che assumono medicinali antiepilettici, in particolare se si assume più di un medicinale antiepilettico contemporaneamente.

Se è in gravidanza o pensa di poter essere in gravidanza, informi immediatamente il medico. Non smetta di prendere il medicinale senza averne discusso con il medico. Se smette di prendere il medicinale senza consultare il medico, può andare incontro a crisi epilettiche che possono essere pericolose per lei e per il nascituro. Il medico potrebbe decidere di modificare il trattamento.

Se lei è una donna in età fertile e non sta pianificando una gravidanza, usi misure contraccettive efficaci durante il trattamento con ESLICARBAZEPINA DOC. ESLICARBAZEPINA DOC può alterare il modo d'azione dei contraccettivi ormonali come la pillola contraccettiva (pillola per il controllo delle nascite), e renderli meno efficaci nel prevenire una gravidanza. Pertanto, si raccomanda di utilizzare altre forme di contraccezione sicure ed efficaci durante l'assunzione di ESLICARBAZEPINA DOC. Si rivolga al medico, che discuterà con lei dei metodi contraccettivi più adatti da usare durante il trattamento con ESLICARBAZEPINA DOC. Se interrompe il trattamento con ESLICARBAZEPINA DOC, continui a utilizzare misure contraccettive efficaci fino alla fine del ciclo mestruale in corso.

Se prende ESLICARBAZEPINA DOC durante la gravidanza, suo figlio corre anche il rischio di problemi di sanguinamento subito dopo la nascita. Il medico potrà somministrare un medicinale a lei e a suo figlio per prevenire questi problemi.

Non allatti durante l'assunzione di ESLICARBAZEPINA DOC. Non si sa se il medicinale passi nel latte materno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

ESLICARBAZEPINA DOC può procurarle capogiri o sonnolenza e modificarle la vista, soprattutto all'inizio del trattamento. In questi casi non guidi e non usi strumenti o macchinari.

ESLICARBAZEPINA DOC contiene sodio

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa, cioè essenzialmente 'senza sodio'.

3. Come prendere ESLICARBAZEPINA DOC

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Adulti

Dose per l'inizio del trattamento

400 mg una volta al giorno per una o due settimane, prima di aumentarla fino a raggiungere la dose di mantenimento. Il medico deciderà se farle prendere questa dose per una o due settimane.

Dose di mantenimento

La dose di mantenimento abituale è 800 mg una volta al giorno. In base alla risposta a ESLICARBAZEPINA DOC, si può aumentare la dose fino a 1.200 mg una volta al giorno. Se prende ESLICARBAZEPINA DOC da solo, il medico può valutare se può trarre beneficio da una dose di 1.600 mg una volta al giorno.

Pazienti con problemi renali

Se ha problemi renali riceverà in genere una dose più bassa di ESLICARBAZEPINA DOC. Il medico stabilirà la dose adatta a lei. ESLICARBAZEPINA DOC non è raccomandato se ha problemi renali severi.

Anziani (età superiore a 65 anni)

Se è anziano e prende ESLICARBAZEPINA DOC da solo, la dose di 1.600 mg non è adatta a lei.

Bambini di età superiore ai 6 anni

Dose per l'inizio del trattamento

La dose iniziale è di 10 mg per kg di peso corporeo una volta al giorno per una o due settimane, prima di aumentarla fino a raggiungere la dose di mantenimento.

Dose di mantenimento

In base alla risposta a ESLICARBAZEPINA DOC, la dose può essere aumentata di 10 mg per kg di peso corporeo, a intervalli di una o due settimane, fino a 30 mg per kg di peso corporeo. La dose massima è di 1.200 mg una volta al giorno.

Bambini che pesano 60 kg o più

I bambini che pesano 60 kg o più devono prendere la stessa dose degli adulti.

Per i bambini possono essere più adatte altre forme del medicinale, come la sospensione orale. Consulti il medico o il farmacista.

Modo e via di somministrazione

ESLICARBAZEPINA DOC è per uso orale. Ingerisca la compressa con un bicchiere d'acqua. Le compresse di ESLICARBAZEPINA DOC possono essere assunte con o senza cibo. La compressa può essere divisa in dosi uguali.

Se prende più ESLICARBAZEPINA DOC di quanto deve

Se accidentalmente prende più ESLICARBAZEPINA DOC di quanto deve, corre potenzialmente il rischio di avere più convulsioni; oppure, può avvertire un battito cardiaco irregolare o più rapido. Contatti il medico oppure si rechi immediatamente in ospedale se manifesta uno qualsiasi dei sintomi sopra riportati. Porti con sé la confezione del medicinale per far sapere al medico che cosa ha preso.

Se dimentica di prendere ESLICARBAZEPINA DOC

Se dimentica di prendere una compressa, la prenda appena se ne ricorda e prosegua come al solito. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con ESLICARBAZEPINA DOC

Non interrompa all'improvviso l'assunzione delle compresse. Correrrebbe il rischio di avere un maggior numero di crisi. Il medico deciderà per quanto tempo dovrà prendere ESLICARBAZEPINA DOC. Se il medico deciderà di interrompere il trattamento con ESLICARBAZEPINA DOC, in genere le ridurrà il dosaggio gradualmente. È importante concludere il trattamento secondo le indicazioni del medico, altrimenti i sintomi possono peggiorare.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

I seguenti effetti indesiderati possono essere molto gravi. Se le accadesse di riconoscerne qualcuno smetta di prendere ESLICARBAZEPINA DOC e ne parli con un medico oppure si rechi immediatamente in ospedale: può avere bisogno di un trattamento medico urgente:

- Vescicole o desquamazione della pelle e/o delle mucose, eruzione cutanea, problemi a deglutire o a respirare, gonfiore alle labbra, al viso, alle palpebre, alla gola o alla lingua. Possono essere i segni di una reazione allergica.

Effetti indesiderati **molto comuni** (possono interessare più di 1 persona su 10) sono:

- capogiri o sonnolenza.

Effetti indesiderati **comuni** (possono interessare fino a 1 persona su 10) sono:

- sensazione di instabilità, di ruotare su se stessi o di fluttuare;
- nausea o vomito;
- mal di testa;
- diarrea;
- visione doppia o offuscata;
- difficoltà di concentrazione;
- sensazione di scarsa energia o di stanchezza;
- tremore;
- eruzione cutanea;
- esami del sangue che indicano bassi livelli di sodio;
- diminuzione dell'appetito;
- difficoltà a dormire;
- difficoltà di coordinazione dei movimenti (atassia);
- aumento di peso.

Effetti indesiderati **non comuni** (possono interessare fino a 1 persona su 100) sono:

- goffaggine;
- allergia;
- stitichezza;
- crisi epilettiche;
- scarsa attività della tiroide. I sintomi comprendono riduzione del livello dell'ormone della tiroide (visto negli esami del sangue), intolleranza al freddo, lingua ingrossata, unghie o capelli sottili e fragili e bassa temperatura corporea;
- problemi al fegato (come aumento degli enzimi epatici);
- pressione sanguigna alta o grave aumento nella pressione sanguigna;
- pressione sanguigna bassa o un abbassamento della pressione quando ci si alza in piedi
- esami del sangue che indicano bassi livelli di sale (incluso cloruro) o una riduzione del numero dei globuli rossi;
- disidratazione;

- alterazioni dei movimenti degli occhi, visione confusa o occhio rosso;
- cadute;
- ustione;
- scarsa memoria o dimenticanza;
- pianto, senso di depressione, nervosismo o confusione, mancanza di interesse o di emozioni;
- incapacità di parlare o scrivere o di comprendere il linguaggio parlato o scritto;
- agitazione;
- disturbo da deficit di attenzione/iperattività;
- irritabilità;
- cambiamenti dell'umore o allucinazioni;
- difficoltà a parlare;
- sanguinamento dal naso;
- dolore al torace;
- formicolio e/o sensazione di intorpidimento in qualsiasi parte del corpo;
- emicrania;
- sensazione di bruciore;
- senso anomalo del tatto;
- disturbi dell'olfatto;
- ronzio (tintinnio) nelle orecchie;
- difficoltà di udito;
- gonfiore alle gambe o alle braccia;
- bruciore di stomaco, fastidio allo stomaco, dolore addominale, gonfiore addominale e fastidio alla bocca o bocca asciutta;
- feci scure (presenza di sangue nelle feci);
- gengive infiammate o mal di denti;
- sudorazione o pelle secca;
- prurito;
- alterazioni della pelle (es. pelle arrossata);
- perdita dei capelli;
- infezione delle vie urinarie;
- sensazione di debolezza generale, malessere o brividi;
- perdita di peso;
- dolore muscolare, dolore agli arti, debolezza muscolare;
- disturbi del metabolismo osseo;
- aumento di proteine dell'osso;
- rossore, freddo agli arti;
- battito cardiaco più lento o irregolare;
- sensazione di estrema sonnolenza;
- sedazione;
- disturbi neurologici del movimento che comportano una contrazione dei muscoli che causa torsioni e movimenti ripetitivi o posture anomale. I sintomi comprendono tremore, dolore, crampi;
- tossicità da medicinali;
- ansia.

Effetti indesiderati **non noti** (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili) sono:

- riduzione delle piastrine, che aumenta il rischio di sanguinamento o lividi;
- severo mal di schiena e mal di stomaco (causato da un'infezione del pancreas);
- riduzione dei globuli bianchi, che aumenta la probabilità di infezioni;
- macchie rossastre a forma di bersaglio o chiazze circolari, spesso con vescicole al centro, sul tronco, desquamazione cutanea, ulcere (lesioni) in bocca, in gola, nel naso, ai genitali e agli occhi, occhi arrossati e gonfi, eventualmente preceduti da febbre e/o sintomi simili a quelli influenzali (sindrome di Stevens-Johnson/necrolisi epidermica tossica);
- inizialmente sintomi simili a quelli influenzali, eruzione cutanea sul viso e in seguito diffusa in altre parti del corpo, temperatura corporea elevata, aumento degli enzimi epatici, anomalie del sangue (eosinofilia), ingrossamento dei linfonodi e coinvolgimento di altri organi (reazione da

farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici, anche denominata DRESS o sindrome da ipersensibilità al farmaco);

- grave reazione allergica che causa gonfiore al viso, alla gola, alle mani, ai piedi, alle caviglie o alla parte inferiore delle gambe;
- orticaria (eruzione cutanea con prurito);
- letargia, confusione, contrazioni muscolari o peggioramento significativo delle convulsioni (possibili sintomi di bassi livelli di sodio nel sangue a causa di una secrezione inappropriata di ADH).

L'uso di ESLICARBAZEPINA DOC si associa a un'anomalia dell'ECG (elettrocardiogramma) chiamata allungamento dell'intervallo PR. Si possono verificare effetti indesiderati associati a questa anomalia dell'ECG (es. svenimento o rallentamento del battito cardiaco).

Ci sono stati casi di disturbi ossei inclusi osteopenia ed osteoporosi (assottigliamento delle ossa) e fratture con medicinali antiepilettici strutturalmente correlati come carbamazepina ed oxcarbazepina.

Consulti il medico o il farmacista, se è in terapia anti-epilettica a lungo termine, se ha precedenti di osteoporosi, o se assume steroidi.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare ESLICARBAZEPINA DOC

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sul blister e sulla scatola dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene ESLICARBAZEPINA DOC

- Ciascuna compressa contiene 200 mg o 800 mg di eslicarbazepina acetato.
- Gli altri componenti sono povidone K29/32, croscarmellosa sodica e magnesio stearato.

Descrizione dell'aspetto di ESLICARBAZEPINA DOC e contenuto della confezione

ESLICARBAZEPINA DOC 200 mg compresse

Comprese di colore da bianco a biancastro, ovali e biconvesse, di 11,3 mm di lunghezza con I impresso su un lato e una linea di frattura su entrambi i lati. La compressa può essere divisa in dosi uguali.

Le compresse sono confezionate in blister trasparenti in scatole di cartone contenenti 10 compresse per blister, con confezione da 60 compresse.

ESLICARBAZEPINA DOC 800 mg compresse

Compresse di colore da bianco a biancastro, ovali e biconvesse di 19 mm di lunghezza con IC impresso su un lato e una linea di frattura su un lato. La compressa può essere divisa in dosi uguali.

Le compresse sono confezionate in blister trasparenti in scatole di cartone contenenti 10 compresse per blister, con confezione da 20 compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

DOC Generici S.r.l. – Via Turati 40 – 20121 - Milano (Italia).

Produttore:

Coripharma ehf. - Reykjavikurvegur 78 - IS-220 Hafnarfjörður (Islanda).

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio economico europeo con le seguenti denominazioni:

Islanda Eslicarbazepin Doc

Italia ESLICARBAZEPINA DOC

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato in Luglio 2022.